

Posologia

Agitar bem antes de usar.

Exclusivamente para uso tópico.

Não deve ser injetado.

Para evitar a contaminação, não toque o conta-gotas do frasco.

Instilar 1 ou 2 gotas no saco conjuntival do olho afetado 4 vezes por dia.

Durante as primeiras 24 a 48 horas a dose pode ser aumentada para 2 gotas a cada 2 horas.

Se não ocorrer melhora após duas semanas, consultar o médico. Deve-se tomar cuidado para não interromper o tratamento prematuramente.

Indicações do produto

Acetato de Fluormetolona Suspensão Oftálmica é indicado para o tratamento de condições alérgicas e inflamatórias da conjuntiva palpebral e bulbar, córnea e segmento anterior do olho que respondem aos esteroides

Contra Indicações

Também é contraindicado nos casos de infecções bacterianas agudas não tratadas, ceratite aguda por herpes simples, vacínia, varicela e outras infecções virais da córnea e conjuntiva, doenças micóticas das estruturas oculares, infecções oculares por micobactéria.

Efeitos Colaterais

As seguintes reações adversas foram identificadas no período pós-comercialização após a administração de Acetato de Fluormetolona. As frequências não podem ser estimadas a partir dos dados disponíveis. Dentro de cada classificação de sistema de órgãos, as reações adversas são apresentadas em ordem decrescente de gravidade.

Classificação de sistema de órgãos Reações adversas [termo MedDRA (v.15.1)]

Distúrbios oculares Aumento da pressão intraocular, dor nos olhos, irritação nos olhos, desconforto nos olhos, sensação de corpo estranho nos olhos, visão turva, hiperemia ocular, aumento do lacrimejamento

Distúrbios gastrointestinais Disgeusia

Em caso de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

04173.