

Posologia

Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica)

Indicações do produto

Comprimidos

Acetato de Medroxiprogesterona Comprimidos é indicado no tratamento de amenorreia secundária, sangramento uterino disfuncional devido ao desequilíbrio hormonal, na ausência de patologias orgânicas, como mioma ou carcinoma uterino; e na terapia hormonal em oposição aos efeitos endometriais do estrogênio em mulheres na menopausa não histerectomizadas, como complemento à terapia estrogênica.

Suspensão Injetável 150 mg/mL

Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Injetável 150 mg/mL suspensão injetável é indicado como contraceptivo.

É um anticoncepcional injetável de ação prolongada, que deve ser administrado em intervalos de 12 a 13 semanas, sendo no máximo a cada 13 semanas (91 dias). Se passados mais de 91 dias da última aplicação, deve-se excluir gravidez através de um teste sanguíneo antes de realizar uma nova aplicação de Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Injetável 150 mg/mL.

Uso por Longo Prazo

Uma vez que a perda da densidade mineral óssea pode ocorrer em mulheres na pré-menopausa, que utilizam Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Injetável 150 mg/mL injetável a longo-prazo, uma avaliação do risco/benefício, que também considere a diminuição da densidade mineral óssea que ocorre durante a gravidez e/ou lactação, deve ser considerada.

Suspensão Injetável 160 mg/mL

Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Injetável 160 mg/mL é indicado como contraceptivo e também é indicado para o manejo da dor associada à endometriose.

Uso por Longo Prazo

Uma vez que a perda da densidade mineral óssea pode ocorrer em mulheres na pré-menopausa, que utilizam Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Injetável 160 mg/mL a longo-prazo, uma avaliação do risco/benefício, que também considere a diminuição da densidade mineral óssea ocorrida durante a gravidez e ou lactação, deve ser considerada.

Contra Indicações

Acetato de Medroxiprogesterona Comprimidos é contraindicado nas seguintes condições: presença ou histórico de tromboflebite, distúrbios tromboembólicos e cerebrovasculares. Insuficiência hepática grave. Presença ou suspeita de doença maligna de órgãos genitais. Sangramento vaginal de causa não diagnosticada. Hipersensibilidade conhecida à medroxiprogesterona, ou a qualquer componente da fórmula.

Acetato de Medroxiprogesterona Comprimidos está contraindicado na presença ou suspeita de doença maligna de mama.

Acetato de Medroxiprogesterona Comprimidos é um medicamento classificado na categoria X de risco de gravidez. Portanto, este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento.

Este medicamento é contraindicado para uso em mulheres grávidas.

Suspensão Injetável 150 mg/mL

Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Injetável 150 mg/mL é contraindicado para uso por pacientes grávidas ou com suspeita de gravidez como teste para diagnóstico de gravidez, a pacientes com hipersensibilidade conhecida ao Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Injetável 150 mg/mL ou a qualquer componente da fórmula; a pacientes com sangramento vaginal de causa não-diagnosticada; a pacientes com suspeita de neoplasia mamária ou neoplasia mamária comprovada; a pacientes com disfunção hepática grave; a pacientes com tromboflebite ativa ou história atual ou progressa de distúrbios tromboembólicos ou cerebrovasculares; pacientes com história de aborto retido.

Este medicamento é contraindicado para uso por homens.

Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Injetável 150 mg/mL injetável não é indicado antes da menarca.

Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Injetável 150 mg/mL é um medicamento classificado na categoria X de risco de gravidez. Portanto, este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento.

Suspensão Injetável 160 mg/mL

Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Injetável 160 mg/mL é contraindicado em pacientes com as seguintes condições: grávidas ou com suspeita de gravidez; a pacientes com sangramento vaginal de causa não diagnosticada; a pacientes com disfunção hepática grave; a pacientes com hipersensibilidade conhecida ao Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Injetável 160 mg/mL ou a qualquer componente da fórmula; a pacientes com suspeita de neoplasia mamária ou neoplasia mamária comprovada.

Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Injetável 160 mg/mL é um medicamento classificado na categoria X de risco de

Efeitos Colaterais

A tabela abaixo fornece uma lista de reações adversas a medicamentos com frequência baseada em todos os dados de causalidade de estudos clínicos Fase 3 que avaliaram a eficácia e segurança do Medroxiprogesterona Comprimidos em ginecologia. As reações adversas a medicamentos relatadas mais frequentemente (>5%) foram sangramento uterino disfuncional (19%), cefaleia (12%) e náusea (10%).

Classe de Sistema de Órgãos

Muito Comum $\geq 1/10$ Comum $\geq 1/100$ a $< 1/10$ Incomum $\geq 1/1000$ a $< 1/100$
Frequência não conhecida (não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis)

Distúrbios do sistema imune

- Hipersensibilidade ao medicamento -
Reação anafilática, reação anafilatoide, angioedema

Distúrbios endócrinos

- - -
Anovulação prolongada

Distúrbios psiquiátricos

- Depressão, insônia, nervosismo - -
Distúrbios do sistema nervoso

Cefaleia Tontura -
Sonolência

Distúrbios vasculares

- - -
Embolismo e trombose

Distúrbios gastrointestinais

Náusea - - -

DCB-Denominação Comum Brasileira

05563.