

Posologia

Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica)

Indicações do produto

Quando a terapia oral não é factível e a potência, a dose e a via de administração do produto o tornam mais apropriado ao tratamento da doença, o uso intramuscular de Acetato de Metilprednisolona está indicado em:

Distúrbios Endócrinos

Insuficiência adrenocortical primária ou secundária (o medicamento de eleição é a hidrocortisona ou a cortisona; análogos sintéticos podem ser utilizados em associação com mineralocorticoides quando aplicável; a suplementação com mineralocorticoides é de especial importância nos primeiros anos de vida).

Insuficiência adrenocortical aguda (o medicamento de eleição é a hidrocortisona ou a cortisona; quando se usa análogos sintéticos, pode ser necessária a suplementação com mineralocorticoides).

Hiperplasia adrenal congênita;

Hipercalcemia associada ao câncer;

Tiroidite não supurativa.

Distúrbios reumáticos

Como terapia adjuvante para administração a curto prazo (para ajudar o paciente a superar um episódio agudo ou uma exacerbação) em:

Osteoartrite pós-traumática;

Epicondilite;

Sinovite de osteoartrite;

Tenossinovite aguda não-específica;

Artrite reumatoide, incluindo artrite reumatoide juvenil (casos selecionados podem exigir terapia de manutenção com doses baixas);

Artrite psoriática;

Artrite gotosa aguda;

Espondilite anquilosante;

Bursite aguda ou subaguda.

Doenças do colágeno

Durante uma exacerbação ou como terapia de manutenção em casos selecionados de:

Lúpus eritematoso sistêmico;

Dermatomiosite sistêmica (polimiosite);

Cardite reumática aguda.

Doenças dermatológicas

Pênfigo;

Dermatite herpetiforme bolhosa;

Eritema multiforme grave (síndrome de Stevens-Johnson);

Dermatite seborreica grave;

Contra Indicações

Acetato de Metilprednisolona é contraindicado a:

Pacientes com infecções sistêmicas por fungos;

Pacientes com hipersensibilidade conhecida ao Acetato de Metilprednisolona ou a qualquer componente da formulação.

Este medicamento é contraindicado para uso por via intravenosa, intratecal e epidural.

A administração de vacinas de vírus vivo ou vírus vivo atenuado é contraindicada em pacientes que recebem doses imunossupressoras de corticosteroides.

Efeitos Colaterais

International Organizations of Medical Sciences) listadas em ordem decrescente de gravidade médica dentro de cada categoria de frequência e SOC.

Classe de Sistema de Órgãos

Muito Comum $\geq 1/10$ Comum $\geq 1/100$ a $< 1/10$ Incomum $\geq 1/1.000$ a $< 1/100$ Rara $\geq 1/10.000$ a $< 1/1.000$ Muito Rara $< 1/10.000$
Frequência não conhecida (não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis)

Infecções e infestações

Infecção oportunista; infecção; peritonite# ; infecção no local da injeção

Distúrbios do sangue e sistema linfático

Leucocitose

Distúrbios do sistema imunológico

Hipersensibilidade ao medicamento; reação anafilática; reação anafilactoide

Distúrbios endócrinos

Cushingoide; hipopituitarismo; síndrome de retirada de esteroides

Distúrbios metabólicos e de nutrição

Acidose metabólica; retenção de sódio; retenção de fluidos; alcalose hipocalêmica; dislipidemia; tolerância à glicose prejudicada; aumento da necessidade de insulina (ou agentes hiperglicêmicos orais em diabéticos); lipomatose; aumento do apetite (que pode resultar em aumento de peso)

Distúrbios psiquiátricos

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem