

## Acriflavina + Metenamina + Metilitionínio + Belladonna

### Posologia

Recomenda-se ingerir 2 drágeas, 3 vezes ao dia, em horários que não coincidam com as refeições.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado

### Indicações do produto

Este medicamento é indicado como antisséptico das vias urinárias nos casos de disúria, dor, ardor e desconforto para urinar.

### Contra Indicações

Acridina + Metenamina + Metilitionínio + Belladonna é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula e nos casos de:

Glaucoma de ângulo aberto;

Insuficiência hepática (porque há liberação de amônia no trato gastrintestinal).

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

### Efeitos Colaterais

Acridina + Metenamina + Metilitionínio + Belladonna é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula e nos casos de:

Glaucoma de ângulo aberto;

Insuficiência hepática (porque há liberação de amônia no trato gastrintestinal).

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

### DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem