

Posologia

Este produto deve ser utilizado unicamente por via tópica.

Instruções para uso e manuseio de Alantoína + Cepalin + Heparina Sódica

Aplicar o produto com massagem moderada sobre a pele ou tecido escarificado (até completa absorção do gel).

Nos casos de cicatrizes antigas ou endurecidas o produto pode ser aplicado utilizando-se uma gaze de proteção durante a noite.

Dependendo do tamanho da cicatriz ou da contratadura, o tratamento será necessário durante várias semanas.

Posologia

Pacientes adultos

Em geral Alantoína + Cepalin + Heparina Sódica é aplicado no local 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica.

No caso de tratamento de cicatrizes recentes, evitar qualquer irritação na pele, por exemplo, frio extremo, luz ultravioleta ou massagens fortes. Em cicatrizes recentes, é adequado iniciar a utilização de Alantoína + Cepalin + Heparina Sódica, 7 a 10 dias após a retirada dos pontos cirúrgicos, ou conforme orientação médica.

Pacientes com insuficiência renal (doença dos rins) e/ou hepática (doença no fígado)

Não é necessário ajuste de dose, recomenda-se a mesma dose para a população em geral.

Pacientes pediátricos (crianças)

Recomenda-se a mesma dose para adultos.

Pacientes idosos

Recomenda-se a mesma dose para adultos.

Indicações do produto

cosmeticamente desfavoráveis, amputações, queimaduras e acidentes, contrataduras como as de Dupuytren, contrataduras tendinosas, traumáticas e retrações cicatriciais.

Contra Indicações

Alantoína + Cepalin + Heparina Sódica não deverá ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Efeitos Colaterais

Reação comum (>1/100 e < 1/10)

Prurido, eritema, telangiectasia, atrofia da cicatriz.

Reação incomum (>1/1.000 e < 1/100)

Hiperpigmentação da pele, atrofia da pele.

Reações com frequência desconhecida

Dor no local de aplicação e inchaço local, urticária, irritação da pele, pápula, inflamação da pele, sensação de queimação na pele, sensação de espessamento da pele, hipersensibilidade, rash pustular.

Em geral, Alantoína + Cepalin + Heparina Sódica é bem tolerado, mesmo utilizado por longos períodos de tempo.

A coceira, uma reação incomum observada durante o tratamento com Alantoína + Cepalin + Heparina Sódica, é uma manifestação da cicatrização e geralmente não requer descontinuação do tratamento.

Em caso de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem