

Posologia

Frascos âmbar de 60 e 100 mL

Como digestivo, tomar uma colher de sopa (15 mL) de Aloe ferox + Gentiana lutea uma vez ao dia, via oral, pura ou diluída em um pequeno volume de água (cerca de 50 ml). Em casos de constipação intestinal ocasional de origem inespecífica (prisão de ventre), tomar uma colher de sopa (15 mL), via oral antes de dormir.

Flaconete 15 mL

Como digestivo, tomar um flaconete de Aloe ferox + Gentiana lutea uma vez ao dia, via oral, pura ou diluída em um pequeno volume de água (cerca de 50 ml). Em casos de constipação intestinal ocasional de origem não específica (prisão de ventre), tomar um flaconete de 15 mL, via oral antes de dormir.

O limite máximo de uso diário é de 15 ml do produto.

Indicações do produto

constipação intestinal ocasional de origem inespecífica (CID K59.0), indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Por ser um laxante suave, é indicado em casos de constipação intestinal ocasional de origem inespecífica (prisão de ventre).

Contra Indicações

Não deve ser usado por mães que estão amamentando, pois algumas substâncias passam através do leite.

Este medicamento é contra-indicado para uso por pacientes em recuperação alcoólica por conter álcool em sua formulação.

Este medicamento é contra-indicado para uso por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Este medicamento é contra-indicado para menores de 12 anos de idade.

Aloe ferox + Gentiana lutea está classificada na categoria de risco B de acordo com o guia para frases de alerta associadas a categorias de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas.

Os estudos em animais não demonstraram risco fetal, porém não há estudos controlados em mulheres grávidas.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento é contra-indicado nos casos de constipação crônica, abdômen agudo, dor abdominal, doenças inflamatórias intestinais agudas (colites, Doença de Chron), obstrução intestinal, apendicite, dor abdominal de origem desconhecida e desordens renais.

Efeitos Colaterais

Ainda não foram relatadas reações adversas referentes ao uso de Aloe ferox + Gentiana lutea, não sendo conhecidas, portanto, a intensidade e a frequência destas.

Em relação as suas substâncias ativas são conhecidas algumas reações adversas, relatadas a seguir:

Reação comum (ocorre entre 1 a 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)

Cólicas gastrointestinais.

Reação rara (ocorre entre 0,01% a 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento)

Diminuição da motilidade intestinal (associando ao uso prolongado) e arritmias cardíacas.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – Notivisa, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem