

**Posologia**

Nos primeiros sinais de desconforto digestivo, agitar o frasco para obter uma mistura escura uniforme.

Preencher a seringa dosadora conforme tabela a seguir e distribuir o líquido lentamente, gota-a-gota, na boca, entre a bochecha e as gengivas. Não dispensar mais rápido do que o bebê é capaz de engolir confortavelmente.

Peso Dose

Abaixo de 9kg 1,25mL

Acima de 9kg 2,5mL

Se necessário, repetir uma vez a cada 60 minutos para até 3 doses, ou conforme indicado pelo médico. Não exceder o equivalente de 4 doses completas por dia, de acordo com a categoria de peso do bebê.

Tampar o frasco, limpar a seringa dosadora e deixá-la secar ao ar após cada utilização.

A maioria dos bebês experimenta alívio com a primeira dose de Aloe socotrina + Associação. No entanto, alguns bebês podem demorar mais tempo antes de demonstrar melhoria perceptível. Recomendamos administrar Aloe socotrina + Associação até uma semana para observar plenamente seus efeitos. Tenha em mente que muitos bebês simplesmente têm problemas para se acalmar quando o ciclo de choro já começou, por isso recomenda-se administrar Aloe socotrina + Associação aos primeiros sinais de desconforto.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido na bula. Não desaparecendo os sintomas em até 7 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos. O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

**Indicações do produto**

O medicamento homeopático Aloe socotrina + Associação é indicado como auxiliar no alívio do desconforto causado por cólicas, gases e diarreia.

A cólica é definida como choro inconsolável que dura mais de 3 horas por dia durante pelo menos 3 dias por semana. Cólica é uma condição autolimitante e tipicamente cessa aos 3-4 meses de idade. A maioria dos especialistas sugerem o desconforto gastrointestinal como causa, devido ao sistema digestivo do bebê ainda não ter se desenvolvido completamente.<sup>1,2,3</sup>

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

Referências:

1. Intestinal hyperperistalsis is one part of the clinical picture in infantile colic.- Motilin, Vasoactive Intestinal Peptide and Gastrin in Infantile Colic by L. Lothe, M.D., S. A. Ivarsson, M.D., and T. Lindberg, M.D.
2. Various factors act in tandem, leading to disturbances in infant gastrointestinal motility that manifest clinically as colic.- Is colic a gastrointestinal disorder? by Gupta, Sandeep K., M.D.
3. Observation of colicky infants has suggested a gastrointestinal origin for this discomfort." infantile colic by Zvi Weizman, M.D., Soliman Alkrinawi, M.D., Dan Goldfarb, M.D., and Chairn Bitran, M.D.

**Contra Indicações**

Este medicamento não deve ser utilizado por pessoas hipersensíveis aos componentes da fórmula.

**Efeitos Colaterais**

Não existem relatos de reações adversas na utilização de Aloe socotrina + Associação. É uma combinação de oito ativos homeopáticos, cada um com uma longa história de uso seguro. A formulação de Aloe socotrina + Associação não contém açúcar, bicarbonato de sódio, simeticona, óleos vegetais, soja, laticínios, trigo, glúten, derivados animais, aromatizantes ou corantes artificiais.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

#### **DCB-Denominação Comum Brasileira**

Não tem