

Posologia

Amoxicilina tri-hidratada + Claritomicina + Esomeprazol Magnésico tri-hidratado deve ser administrado por via oral, com líquido e conforme orientação médica.

Posologia

Tratamento tríplice

Pela manhã

Tome 1 comprimido revestido de liberação retardada de esomeprazol magnésico tri-hidratado 20mg, 1 comprimido revestido de claritromicina e 2 cápsulas de amoxicilina de uma só vez em jejum. Engolir um a um, no mesmo horário.

À noite

Tome 1 comprimido revestido de liberação retardada de esomeprazol magnésico tri-hidratado 20mg, 1 comprimido revestido de claritromicina e 2 cápsulas de amoxicilina de uma só vez antes do jantar. Engolir um a um, no mesmo horário, da mesma forma que você tomou pela manhã.

Após o tratamento tríplice, tomar 1 comprimido revestido de liberação retardada de esomeprazol magnésico tri-hidratado 20mg em jejum, uma vez ao dia por 28 dias (vide tabela abaixo).

Tabela 1: Tratamento com esquema tríplice por 1 semana e continuação do uso de esomeprazol magnésico tri-hidratado por mais 28 dias

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Não use o medicamento com prazo de validade vencido.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Indicações do produto

indicado para redução do risco de recorrência da úlcera de estômago ou de intestino através da eliminação do microrganismo *Helicobacter pylori*.

Contra Indicações

Amoxicilina tri-hidratada + Claritromicina + Esomeprazol Magnésico tri-hidratado é contra-indicado para pacientes com conhecida hipersensibilidade aos componentes da fórmula inclusive esomeprazol, claritromicina, amoxicilina ou qualquer antibiótico macrolídeo ou qualquer penicilina.

Não há contraindicação do uso da amoxicilina, assim como todas as penicilinas, para uso durante a gestação. A claritromicina só deverá ser utilizada durante a gestação se não houver outra opção disponível. O esomeprazol só deverá ser utilizado durante a gestação se não houver outra opção disponível.

Uso na gravidez

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Amoxicilina

Categoria de risco na gravidez B.

As penicilinas, assim como a amoxicilina, atravessam a placenta. Estudos adequados quanto a teratogenicidade em humanos ainda não foram realizados. Entretanto, várias penicilinas são amplamente utilizadas em mulheres grávidas e nenhum problema foi documentado.

Claritromicina

Apresenta o risco gestacional Categoria C.

A segurança do uso de claritromicina durante a gravidez ainda não foi estabelecida. Estudos de teratogênese em animais, com doses 70 vezes superiores às terapêuticas para uso humano, mostraram aumento da incidência de anormalidades fetais.

Esomeprazol

Categoria de risco na gravidez C.

Não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas. Deve-se tomar cuidado na prescrição para mulheres grávidas. Não se sabe se o esomeprazol é excretado no leite humano. Não foram realizados estudos em lactantes. Portanto, esomeprazol não deve ser usado durante a amamentação.

Efeitos Colaterais

esperados de acordo com seus componentes. Os eventos adversos mais comuns relatados foram diarreia e náusea.

Os seguintes eventos adversos são esperados para os componentes de Esogastro IBP isoladamente

Clarithromicina

Reações comuns(>1/100 e <1/10)

Distúrbios psiquiátricos:

Insônia.

Distúrbios de sistema nervoso:

Disgeusia, cefaleia e paladar alterado

Distúrbios gastrointestinais:

Diarreia, vômito, dispepsia, náusea e dor abdominal.

Distúrbios hepatobiliares:

Teste de função hepática anormal.

Distúrbios de pele e tecidos subcutâneos:

Rash e hiperidrose.

Reações incomuns(>1/1.000 e <1/100)

Infecções e infestações:

Candidíase, e infecção vaginal.

Sistema sanguíneo e linfático:

Leucopenia.

Distúrbios do sistema imunológico:

Hipersensibilidade.

Distúrbios nutricionais e do metabolismo:

Anorexia e diminuição de apetite.

Distúrbios psiquiátricos:

Ansiedade.

DCB-Denominação Comum Brasileira

00734 + 02200 + 03528.