

Posologia

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio destina-se apenas para uso oral.

Para minimizar a potencial intolerância gastrointestinal, recomenda-se administrar o medicamento no início da refeição. Essa forma de administração favorece a absorção de Amoxicilina + Clavulanato de Potássio.

O tratamento não deve ser estendido por mais de 14 dias sem revisão.

Dosagem para tratamento de infecções

Tabela posológica de Amoxicilina + Clavulanato de Potássio

Idade

Apresentação

Dosagem

Adultos e crianças acima de 12 anos*

Comprimidos revestidos de 500 mg + 125 mg

1 comprimido três vezes ao dia

* A dose diária usual recomendada é de 25 mg**/kg, divididos, de 8 em 8 horas. A posologia deve ser aumentada a critério médico, nos casos de infecções graves, usando-se até 50 mg/kg/dia, divididos, de 8 em 8 horas.

** Cada dose de 25 mg de Amoxicilina + Clavulanato de Potássio fornece 20 mg de amoxicilina e 5 mg de ácido clavulânico.

Os comprimidos de Amoxicilina + Clavulanato de Potássio não são recomendados para crianças menores de 12 anos.

Dosagem para insuficiência renal

Adultos:

Insuficiência leve (clearance de creatinina >30 mL/min)

Insuficiência moderada (clearance de creatinina 10-30 mL/min)

Insuficiência moderada (clearance de creatinina 10-30 mL/min)

Sem alterações de dosagem

1 comprimido de 500 mg + 125 mg de 12 em 12 horas

Indicações do produto

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio, deve ser utilizado de acordo com as diretrizes locais para prescrição de antibióticos e dados de sensibilidade.

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio é indicado para tratamento das infecções bacterianas causadas por germes sensíveis aos componentes da fórmula.

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio, bactericida que atua contra ampla gama de microrganismos, é efetivo nas seguintes condições:

Infecções do trato respiratório superior (inclusive ouvido, nariz e garganta), como amigdalite, sinusite e otite média;

Infecções do trato respiratório inferior, como bronquite aguda e crônica, pneumonia lobar e broncopneumonia;

Infecções do trato geniturinário, como cistite, uretrite e pielonefrites;

Infecções de pele e tecidos moles, como furúnculos, abscessos, celulite e ferimentos infectados;

Infecções de ossos e articulações, como osteomielite;

Outras infecções, como aborto séptico, sepse puerperal e sepse intra-abdominal.

A sensibilidade ao Amoxicilina + Clavulanato de Potássio irá variar com a região e com o tempo. Sempre que disponíveis, dados de sensibilidade locais devem ser consultados. Sempre que necessário, amostragem microbiológica e testes de sensibilidade devem ser realizados.

Embora Amoxicilina + Clavulanato de Potássio seja indicado apenas para os processos infecciosos referidos anteriormente, as infecções causadas por germes sensíveis à amoxicilina (ampicilina) também podem ser tratadas com Amoxicilina + Clavulanato de Potássio, devido à presença da amoxicilina em sua fórmula. Assim, as infecções mistas causadas por microrganismos sensíveis à amoxicilina e por microrganismos produtores de betalactamases sensíveis a Amoxicilina + Clavulanato de Potássio não devem exigir a adição de outro antibiótico.

Injetável

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio IV deve ser utilizado de acordo com os guias locais para prescrição de antibióticos e dados de sensibilidade.

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio IV é indicado para tratamentos de curta duração de infecções bacterianas dos seguintes sítios:

Infecções do trato respiratório superior (inclusive ouvido, nariz e garganta), como amigdalite, sinusite e otite média;

Infecções do trato respiratório inferior, como bronquite aguda e crônica, pneumonia lobar e broncopneumonia;

Infecções do trato geniturinário, como cistite, uretrite, pielonefrite e infecções genitais femininas;

Infecções da pele e dos tecidos moles, como furúnculos, abscessos, celulite e ferimentos infectados;

Infecções dos ossos e das articulações, como osteomielite;

Outras infecções, como aborto séptico, sepse puerperal, sepse intra-abdominal, sepse, peritonite e infecções pós-cirúrgicas.

Contra Indicações

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio é contraindicado para pacientes com história de reações alérgicas, hipersensibilidade a penicilinas e disfunção hepática/icterícia associadas a este medicamento ou a outras penicilinas.

Deve-se dar atenção à possível sensibilidade cruzada com outros antibióticos betalactâmicos, como as cefalosporinas.

Efeitos Colaterais

Usaram-se dados de estudos clínicos feitos com grande número de pacientes para determinar a frequência das reações indesejáveis (de muito comuns a raras). A frequência de todas as outras reações indesejáveis (isto é, aquelas que ocorreram em nível menor que 1/10.000) foi determinada utilizando-se, principalmente, dados de póscomercialização e se refere à taxa de relatos, e não à frequência real.

Utilizou-se a seguinte convenção na classificação da frequência das reações:

Muito comuns (>1/10), comuns (>1/100 a <1/10).

Incomuns (>1/1.000 a <1/100).

Raras (>1/10.000 a <1/1.000).

Muito raras (<1/10.000).

Reação muito comum (>1/10)

Diarreia (em adultos).

Reações comuns (>1/100 e <1/10)

Candidíase mucocutânea;

Náusea e vômito (em adultos)*;

Diarreia, náusea e vômitos (em crianças)*;

Vaginite.

Reações incomuns (>1/1.000 e <1/100)

Tontura;

Dor de cabeça;

Indigestão;

Aumento moderado de AST ou ALT em pacientes sob tratamento com antibióticos betalactâmicos, mas o significado desse achado ainda é desconhecido**;

Rash cutâneo, prurido e urticária.

Reações raras (>1/10.000 e <1/1.000)

Leucopenia reversível (inclusive neutropenia) e trombocitopenia;

Eritema multiforme.

Reações muito raras (<1/10.000)

Agranulocitose reversível e anemia hemolítica, prolongamento do tempo de sangramento e do tempo de protrombina;

Edema angioneurótico, anafilaxia, síndrome semelhante à doença do soro e vasculite de hipersensibilidade;

Hiperatividade reversível e convulsões (estas podem ocorrer em pacientes com função renal reduzida ou naqueles que tomam altas doses);

Colite associada a antibióticos (entre elas, colite pseudomembranosa e hemorrágica);

Língua pilosa negra;

Hepatite e icterícia colestática (esses eventos foram observados também com outros penicílicos e cefalosporínicos)**;

DCB-Denominação Comum Brasileira

00734 + 00137.