

Posologia

Posologia sugerida

Uso adulto

1 comprimido sublingual, 3 vezes ao dia. Nos casos agudos, o medicamento poderá ser consumido a cada 30 minutos ou de 1 em 1 hora, porém, no máximo 12 comprimidos por dia. Após a avaliação médica a dose poderá ser modificada e dependendo da necessidade, poderá ser aumentada para 3 comprimidos 3 vezes ao dia.

Uso pediátrico

Conforme a seguinte tabela:

Idade

Dosagem normal

Dosagem com sintomas agudos

4-6 anos

½ comprimido 3 vezes ao dia

½ comprimido 6 vezes ao dia

7-11 anos

1 comprimido 2 vezes ao dia

½ comprimido 8 vezes ao dia

Indicações do produto

Indicado para tratar tontura e vertigens que podem ter origem por diversas causas.

Contra Indicações

Vertigoheel é contra-indicado em pacientes hipersensíveis a quaisquer componentes da fórmula e com intolerância à lactose.

Efeitos Colaterais

O médico deve informar ao paciente para entrar em contato, caso os sintomas persistam por mais de 2 dias, ou se agravem. No caso do tratamento ser longo, acompanhar a evolução do paciente durante todo o período do tratamento.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem