

### Posologia

Ácido Fusídico creme deve ser aplicado como uma camada fina sobre a pele afetada, 2 a 3 vezes ao dia, geralmente, por um período de 7 dias. No tratamento da acne, as aplicações podem ser mais prolongadas, segundo a orientação médica.

Pacientes idosos

Não são necessários cuidados especiais para pacientes idosos.

### Indicações do produto

Ácido Fusídico creme é indicado para o tratamento tópico de infecções da pele causadas por microorganismos sensíveis a este agente anti-infeccioso, em particular a bactéria *Staphylococcus aureus*.

### Contra Indicações

Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes.

### Efeitos Colaterais

espontâneos.

Com base em dados agrupados obtidos a partir de estudos clínicos, incluindo 4.724 pacientes que receberam Ácido Fusídico creme ou pomada, a frequência de efeitos adversos é de 2,3%.

As reações adversas mais frequentemente relatadas durante o tratamento são: reações cutâneas, como prurido e rash, seguida por alterações no local da aplicação, como dor e irritação, sendo que todas ocorreram em menos de 1% dos pacientes.

Foram relatadas hipersensibilidade e angioedema.

Os efeitos adversos são relatados de acordo com as Classes de Sistemas de Órgãos MedDRA e os efeitos adversos individuais são listados a partir dos mais frequentemente relatados.

Dentro de cada grupo de frequência as reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade:

Muito comum  $\geq 1/10$ ;

Comum  $\geq 1/100$  e  $< 1/10$ ;

Incomum  $\geq 1/1.000$  e  $< 1/100$ ;

Rara  $\geq 1/10.000$  e  $< 1/1.000$ ;

Muito rara  $< 1/10.000$ .

Distúrbios do sistema imune

Rara: ( $\geq 1/10.000$  e  $< 1/1.000$ )

Hipersensibilidade

Distúrbios oculares

Rara: ( $\geq 1/10.000$  e  $< 1/1.000$ )

Conjuntivite

Distúrbios do tecido cutâneo e subcutâneo

Incomum: ( $\geq 1/1.000$  e  $< 1/100$ )

Dermatite (incluindo dermatite de contato, eczema)

### DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem