

Posologia

Introduzir um aplicador cheio (4 g) por noite, profundamente na vagina, durante 10 dias consecutivos. Para sua segurança, a bisnaga está hermeticamente lacrada. Esta embalagem não requer o uso de objetos cortantes. A bisnaga contém quantidade suficiente para 10 aplicações. O aplicador preenchido até a trava do êmbolo consome, por dose, a quantidade máxima de 4 g do produto, considerando-se inclusive o resíduo que permanece no mesmo. O conteúdo de Benzoilmetronidazol + Nistatina + Cloreto de Benzalcônio é calculado para dez dias de tratamento contínuos ou a critério médico.

Lavar as mãos antes e após o uso de Benzoilmetronidazol + Nistatina + Cloreto de Benzalcônio e evitar o contato direto das mãos com o local de aplicação.

Retire a tampa da bisnaga (fig. 1).

Perfure o lacre da bisnaga, introduzindo o bico perfurante da tampa (fig. 2).

Rosqueie completamente a cânula do aplicador ao bico da bisnaga (fig. 3).

Segure a bisnaga com uma das mãos, e com a outra puxe o êmbolo do aplicador até encostar no final da cânula (fig. 4).

Com o embolo puxado, aperte vagarosamente a base da bisnaga com os dedos, de maneira a empurrar o creme e preencher a cânula do aplicador até a trava. Atenção: Aperte a bisnaga com cuidado para que o creme não extravase o êmbolo (fig.5).

Desrosqueie o aplicador e feche a bisnaga.

Introduza delicadamente a cânula do aplicador na vagina, o mais profundamente possível, e empurre o êmbolo, até esvaziar o aplicador.

A aplicação faz-se com maior facilidade estando a paciente deitada de costas, com as pernas dobradas e os joelhos afastados. A cada aplicação, utilizar um novo aplicador e após o uso, inutilizá-lo.

Atenção: Não iniciar o preenchimento sem puxar o embolo até o limite da trava. Ao preencher a cânula com este medicamento, aperte a bisnaga com cuidado para que o creme não extravase a trava do êmbolo.

Indicações do produto

Benzoilmetronidazol + Nistatina + Cloreto de Benzalcônio creme vaginal está indicado ao tratamento dos comônios genitais sendo os principais a vaginose bacteriana, candidíase vaginal e tricomoníase. Apresenta em sua formulação uma associação de agentes específicos de ampla e comprovada eficácia contra infecções genitais provocadas por diversos agentes etiológicos como Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Trichomonas vaginalis, entre outras bactérias inespecíficas, causadoras de vulvovaginites, colpites e cervicites.

Contra Indicações

Benzoilmetronidazol + Nistatina + Cloreto de Benzalcônio é contraindicado em pacientes que apresentem hipersensibilidade a quaisquer dos componentes de sua fórmula. Ele também é contraindicado em pacientes que fazem ou fizeram uso de álcool ou preparações que contenham propilenoglicol até 03 dias antes da administração da droga.

Este medicamento é contraindicado em pacientes que fazem ou fizeram uso de dissulfiram até duas semanas que antecederam o uso da medicação.

O uso de metronidazol é contraindicado durante o primeiro trimestre da gestação.

Este medicamento é contraindicado para uso por gestantes no primeiro trimestre de gestação.

Efeitos Colaterais

Reação muito comum (> 1/10)

Corrimento vaginal (12%), vaginite (10 a 15%).

Reação comum (> 1/100 e < 1/10)

Cefaleia (5%), desconforto abdominal(7%), diarreia (1%), inapetência (1%), náusea (4%).

Reação incomum (> 1/1.000 e < 1/100)

Prurido, erupções cutâneas, eczema.

Reação rara (> 1/10.000 e < 1/1.000)

Vermelhidão cutânea, reação de hipersensibilidade.

Reação muito rara (< 1/10.000)

Síndrome de Stevens-Johnson.

Benzoilmetronidazol + Nistatina + Cloreto de Benzalcônio, em contato com os olhos, pode provocar lacrimejamento e irritação ocular.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem