

Posologia

O paciente pode tomar um a dois comprimidos de Bicarbonato de sódio + Carbonato de sódio + Ácido acetilsalicílico + Ácido cítrico, dissolvidos em um copo pequeno de água (200 mL), esperar completar a efervescência e beber de uma vez. Não deve ser ultrapassada a dose máxima diária recomendada, que é de 2 comprimidos deste medicamento a cada 24 horas.

O paciente não deve usar Bicarbonato de sódio + Carbonato de sódio + Ácido acetilsalicílico + Ácido cítrico por mais de 10 dias sem orientação médica.

Siga corretamente o modo de usar. Em casos de dúvidas sobre esse medicamento, procure orientação do farmacêutico.

Não desaparecendo os sintomas, procure orientação do seu médico ou cirurgião-dentista.

Indicações do produto

Bicarbonato de sódio + Carbonato de sódio + Ácido acetilsalicílico + Ácido cítrico é indicado para azia, má digestão e acidez estomacal que se apresentam concomitantemente com dor de cabeça.

Contra Indicações

histórico de:

Hipersensibilidade a quaisquer componentes da fórmula ou a salicilatos; reações de hipersensibilidade (como por exemplo, asma, broncoespasmo, rinite, urticária e pólipos nasais) em resposta ao uso de ácido acetilsalicílico ou de outro antiinflamatório não-estoroidal; úlcera péptica; sangramento ou perfuração gastrointestinal após tratamento com ácido acetilsalicílico ou de outro antiinflamatório não-estoroidal; hemofilia, deficiência de protrombina ou outros distúrbios da coagulação ou gota. Paciente que seguem uma dieta restrita em sódio, como aqueles que sofrem de hipertensão ou insuficiência cardíaca, não devem usar este medicamento sem orientação médica devido à retenção de sódio e água causada.

Efeitos Colaterais

grupos de pacientes. Portanto, são listados na tabela abaixo reações adversas reportadas através da extensiva experiência de pós-comercialização na dose terapêutica rotulada e consideradas atribuíveis ao medicamento.

As reações adversas estão tabeladas por sistema orgânico e por frequência:

Sistema orgânico

Reação adversa

Frequência

Disordens gastrointestinais

Náusea, vômito, dispepsia, eructação, flatulência, distensão abdominal, ulceração gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal e gastrite

Desconhecida*

Disordens renais e urinárias

Disfunção renal e aumento dos níveis sanguíneos de ácido úrico

Desconhecida*

Disordens hepatobiliares

Elevação dos níveis de aminotransferases

Desconhecida*

Disordens do sistema sanguíneo e linfático

Aumento do tempo de sangramento, trombocitopenia e equimose

Desconhecida*

Disordens metabólicas e nutricionais

Retenção de sódio e fluidos

Desconhecida*

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem