

Posologia

Este medicamento é de uso oftálmico. Pacientes devem ser instruídos a não encostar a ponta do frasco nos olhos e nem em outra superfície qualquer, para evitar a contaminação do frasco e do colírio.

A dose recomendada é de 1 gota aplicada no(s) olho(s) afetado(s), duas vezes ao dia. Se a administração for esquecida, o tratamento deve continuar com a próxima dose planejada.

Assim como qualquer medicamento oftálmico, para diminuir a possível absorção sistêmica, recomenda-se comprimir o canto medial do saco lacrimal por pelo menos 1 minuto. Esse procedimento deve ser realizado imediatamente após a aplicação de cada gota.

Indicações do produto

Bimatoprost + Tartarato de Brimonidina + Maleato de Timolol é indicado para redução da pressão intraocular (PIO) em pacientes com glaucoma de ângulo aberto ou hipertensão ocular que requerem o uso de terapia combinada para controle da PIO.

Contra Indicações

Bimatoprost + Tartarato de Brimonidina + Maleato de Timolol é contraindicado em pacientes com as seguintes condições: Pacientes que estão fazendo terapia com inibidor da monoamino oxidase (MAO); Neonatos e crianças abaixo de 2 anos de idade.

Pacientes com doenças respiratórias reativas, incluindo asma brônquica ou paciente com histórico de asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica grave.

Pacientes com bradicardia sinusal, síndrome do nódulo sinusal, bloqueio nodal sino-atrial, bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau não controlado por marcapasso, insuficiência cardíaca descompensada, choque cardiogênico.

Histórico de hipersensibilidade à qualquer componente da formulação.

Efeitos Colaterais

Timolol, por ordem de frequência foram:

Reação muito comum (> 1/10)

Hiperemia conjuntival, irritação ocular, olho seco.

Reação comum (> 1/100 e < 1/10)

Olho seco, conjuntivite, folículos conjuntivais, aumento do lacrimejamento, dor ocular, crescimento dos cílios, papilas conjuntivais, conjuntivite alérgica, irritação ocular, prurido ocular, prurido palpebral, meibomianite, ceratite punctata, hiperpigmentação da pele, dor de cabeça, sonolência, tontura, astenia.

Reação incomum (> 1/1.000 e < 1/100)

Irritação palpebral, prurido palpebral, visão borrada.

Outras reações adversas foram reportadas com as substâncias individualmente e podem ocorrer com Bimatoprost + Tartarato de Brimonidina + Maleato de Timolol:

Bimatoprost

Reações relacionadas ao sistema ocular:

Astenopia, blefarite, blefaro pigmentação, edema conjuntival, enoftalmos, eritema palpebral, eritema periorbital, secreção ocular, escurecimento dos cílios, edema palpebral, prurido palpebral, sensação de corpo estranho, aumento da pigmentação da íris, irite, edema macular, ardor ocular, fotofobia, ceratite punctata, visão borrada, piora da acuidade visual. Reações não relacionadas ao sistema ocular: náusea, irritação no local da aplicação, tontura, asma, exacerbação da asma, dispnéia, crescimento anormal de pelos, hisurtismo, hipertricose, hipertensão arterial.

Brimonidina

Reações relacionadas ao sistema ocular:

Visão anormal, blefarite, sensação de ardor nos olhos, branqueamento da conjuntiva, edema conjuntival, secreção ocular/conjuntival, foliculose conjuntival, erosão/pontada na córnea, epífora, iridoclitite (uveíte anterior), irite, miose, sensação de pontada nos olhos, eritema palpebral, edema palpebral, conjuntivite folicular, sensação de corpo estranho nos olhos, reações de alergia ocular (incluindo blefarite alérgica, blefaroconjuntivite alérgica, reações alérgicas oculares, conjuntivite folicular), hiperemia ocular, fotofobia, ceratite punctata superficial, piora da acuidade visual, distúrbios visuais, visão borrada.

Reações não relacionadas ao sistema ocular:

Palpitação/arritmia (incluindo bradicardia ou taquicardia), sintomas gastrointestinais, secura oral, astenia, tontura, fadiga/sonolência, reações alérgicas, hipersensibilidade, reações na pele (incluindo eritema, edema facial, prurido, rash e vasodilatação), rinite, paladar alterado, depressão, secura nasal, sintomas no sistema respiratório superior, hipotensão, síncope.

Timolol

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem