

**Posologia**

Uso oral.

Uso adulto e pediátrico acima de 5 anos de idade.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Posologia

Adultos

Tomar 1 a 2 comprimidos revestidos, ao deitar.

Crianças acima de 5 anos

Tomar 1 comprimido revestido, ao deitar.

Dose Máxima Diária Recomendada

1 comprimido/dia equivalente a 60mg/dia de docusato de sódio e 5mg/dia de bisacodil.

Este medicamento é contraindicado para menores de 5 anos.

O uso de laxantes estimulantes deve ser feito com cautela, por isso, recomenda-se a utilização deste medicamento até que haja o alívio dos sintomas da obstipação intestinal, desde que a utilização esteja dentro do período de 7 dias sempre respeitando a dosagem recomendada. Períodos maiores de uso deste medicamento somente através de orientação médica.

**Indicações do produto**

O Bisacodil + Docusato de Sódio é uma medicação laxativa utilizada como coadjuvante da evacuação intestinal em pacientes acamados, assim como no pós-operatório e no pós-parto. Na limpeza intestinal prévia a exames radiológicos e no pré-operatório de intervenções anorretais. Para facilitar a defecação em portadores de hemorroidas ou fissuras anais.

**Contra Indicações**

Contraindicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula do produto.

Bisacodil + Docusato de Sódio é contraindicado na presença de dores abdominais, náuseas, vômitos, ou quaisquer sintomas de apendicite, abdômen agudo, compactação fecal, obstrução intestinal, perfuração intestinal, hepatite aguda.

Este medicamento é contraindicado para menores de 5 anos.

**Efeitos Colaterais**

Os eventos adversos com Bisacodil + Docusato de Sódio são apresentados em frequência decrescente a seguir

Reações Comuns (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)

Cólica intestinal leve e diarreia.

Reações raras (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento)

Náuseas, vômitos ou cólicas intestinais intensas. Sangue nas fezes, cólicas severas, fraqueza e hemorragia retal. Se estas reações acontecerem, suspenda o uso da medicação e procure orientação médica.

Em casos de eventos adversos, notifique ao sistema de Notificação em Vigilância Sanitária NOTIVISA ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

**DCB-Denominação Comum Brasileira**

Não tem