

Posologia

não tem

Indicações do produto

Diminuição da pressão intraocular elevada (PIO) em doentes adultos com glaucoma de ângulo aberto ou hipertensão ocular nos casos em que a monoterapia é insuficiente para a redução da PIO.

Contra Indicações

Hipersensibilidade à substância ativa(s) ou a qualquer um dos excipientes ou às sulfonamidas.

Doentes a fazer terapêutica com inibidores da monoamina oxidase (IMAO). Os doentes que tomam antidepressivos que afetem a transmissão noradrenérgica (por exemplo, antidepressivos tricíclicos e mianserina).

Doentes com compromisso renal grave.

Doentes com acidose hiperclorémica.

Recém-nascidos e crianças com idade inferior a 2 anos.

Efeitos Colaterais

Informe o seu médico, o optometrista (oculista) ou farmacêutico se utilizar, tiver utilizado recentemente, ou se vier a utilizar outros medicamentos.

Este medicamento pode afetar ou ser afetado por outros medicamentos que está a utilizar, incluindo outros colírios para o tratamento do glaucoma.

Informe o seu médico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou pretender tomar algum dos seguintes medicamentos:

Medicamentos para baixar a pressão arterial

Medicamentos para o coração incluindo digoxina (usada para tratar doenças do coração)

Outros medicamentos para o glaucoma que também tratam a má disposição a altas altitudes como a acetazolamida, metazolamida e dorzolamida

Medicamentos que podem afetar o metabolismo tais como a clorpromazina, metilfenidato e reserpina

Medicamentos antivirais, antirretrovirais (tipo de medicamentos utilizados para tratar o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)) ou antibióticos

Medicamentos antifúngicos e antimicóticos

Inibidores da Monoamina oxidase (IMAO) ou antidepressivos, incluindo a amitriptilina, ortriptilina, clomipramina, mianserina, venlafaxina e duloxetina

Anestésicos

Sedativos, opiáceos e barbitúricos

Se a dose de qualquer um dos seus medicamentos for alterada.

Utilizar este medicamento com álcool

Se consumir regularmente álcool, pergunte ao seu médico, ao seu optometrista (oculista) ou farmacêutico antes de tomar este

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem