

**Posologia****Bromoprida solução injetável via intravenosa (IV)**

A administração intravenosa de Bromoprida (bromoprida) deve ser feita de forma lenta (superior a 3 minutos) após diluição com solução fisiológica (cloreto de sódio 0,9% ou glicose 5%) para evitar reações adversas como agitação, ansiedade, sonolência e hipotensão.

**Bromoprida solução injetável via intramuscular (IM)**

O conteúdo deve ser injetado profundamente na região deltóide ou na região glútea. A injeção intramuscular de Bromoprida (bromoprida), não deve ser administrada ou por períodos prolongados, sem controle médico.

**Solução Oral / Gotas****Bromoprida solução oral**

Agitar bem o frasco antes de usar. Utilizar o medidor graduado para administração da quantidade exata.

**Bromoprida gotas pediátricas**

24 gotas correspondem a 1 (um) mL. Oriente o paciente a utilizar o gotejador ou a colocar em uma colher a quantidade exata prescrita e então administrar a dose pela via oral.

**Cápsula**

Bromoprida deve ser ingerido com líquido, por via oral.

**Posologia do Bromoprida****Injetável****Uso em adultos**

1 a 2 ampolas (10 a 20 mg) ao dia por via intramuscular ou intravenosa.

**Uso em crianças**

0,5 a 1 mg por quilo de peso ao dia, por via intramuscular ou intravenosa. A bromoprida pode ser associada ao soro glicosado ou fisiológico e as doses podem ser repetidas ou alteradas de acordo com o critério médico.

Não há estudos dos efeitos de Bromoprida administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via intravenosa ou intramuscular.

**Solução Oral / Gotas****Bromoprida solução oral****Uso em adultos:**

10 mL (10 mg) de 12/12 h ou de 8/8 h conforme orientação médica (dose máxima 60 mg/dia).

**Indicações do produto**

Bromoprida está indicado para:

Distúrbios da motilidade gastrointestinal;

Refluxo gastroesofágico;

Náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de medicamentos).

Bromoprida é utilizado também para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrointestinal.

**Contra Indicações**

Bromoprida não deve ser utilizado nos seguintes casos:

Em pacientes com antecedentes de alergia aos componentes da fórmula;

Quando a estimulação da motilidade gastrointestinal seja perigosa, como por exemplo, na presença de hemorragia, obstrução mecânica ou perfuração gastrointestinal;

Em pacientes epiléticos ou que estejam recebendo outras drogas que possam causar reações extrapiramidais, uma vez que a frequência e intensidade destas reações podem ser aumentadas;

Em crianças menores de 1 ano de idade, devido ao risco aumentado da ocorrência de agitação, irritabilidade e convulsões;

Em pacientes com feocromocitoma, pois pode desencadear crise hipertensiva, devido à provável liberação de catecolaminas do tumor. Tal crise hipertensiva pode ser controlada com fentolamina.

Exclusivo Injetável / Solução Oral / Gotas: Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 1 ano.

**Efeitos Colaterais**

Reação muito comum ( $> 1/10$ ).

Reação comum ( $> 1/100$  e  $\leq 1/10$ ).

Reação incomum ( $> 1/1.000$  e  $\leq 1/100$ ).

Reação rara ( $> 1/10.000$  e  $\leq 1/1.000$ ).

Reação muito rara ( $\leq 1/10.000$ ).

Reação muito comum

Inquietação, sonolência, fadiga e lassidão.

Com menor frequência

Pode ocorrer insônia, cefaléia, tontura, náuseas, sintomas extrapiramidais, galactorreia, ginecomastia, erupções cutâneas, incluindo urticária ou distúrbios intestinais.

As reações extrapiramidais podem ser mais frequentes em crianças e adultos jovens, enquanto que movimentos anormais ou perturbados são comuns em idosos sob tratamentos prolongados.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em [www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm](http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm), ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

**DCB-Denominação Comum Brasileira**

01471.