

Posologia

colocado sobre a língua, sem a ingestão de água. É importante deixar o comprimido dissolver sobre a língua. Não mastigar ou engolir por inteiro. Não é recomendada a ingestão de Caladium seguinum + Associações junto com as refeições. Deve ser ingerido, preferencialmente, meia hora antes ou depois da refeição.

A dose recomendada e a duração do tratamento dependem da resposta individual de cada paciente ao tratamento. Porém, é geralmente recomendada a manutenção do tratamento até a diminuição dos sintomas.

Segue esquema posológico de uso adulto sugerido como referência.

Posologia sugerida

1º dia de tratamento:

1 comprimido a cada 1 hora por via oral.

2º dia de tratamento:

1 comprimido a cada 2 horas por via oral.

3º dia de tratamento:

1 comprimido a cada 3 horas por via oral.

4º dia de tratamento:

1 comprimido a cada 4 horas por via oral.

5º dia de tratamento:

1 comprimido a cada 5 horas por via oral.

6º dia de tratamento:

1 comprimido a cada 6 horas por via oral.

Após o 6º dia de tratamento:

Manter a posologia de 1 comprimido a cada 6 horas por via oral.

Não é necessário o uso de Fumasil no período em que estiver dormindo.

Você pode aumentar a dose caso sinta necessidade, caso isso aconteça, apenas recomendamos não exceder a quantidade de 18 comprimidos ao dia.

Indicações do produto

Caladium seguinum + Associações é indicado como auxiliar na redução do desejo intenso de fumar.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

Contra Indicações

Quando o paciente for hipersensível aos componentes da fórmula.

Não foram relatadas, até o momento, contraindicações ao uso do Caladium seguinum + Associações.

Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista (categoria "C").

Efeitos Colaterais

Não são relatados e conhecidos males e limitações de uso dos medicamentos homeopáticos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião-dentista.

Não foram realizados estudos em animais ou em mulheres grávidas.

Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem