

Posologia

Carbonato De Cálcio + Vitamina D deve ser administrado por via oral.

Recomenda-se tomar os comprimidos durante as refeições ou conforme orientação médica.

A dose recomendada é de um comprimido uma a três vezes ao dia.

A posologia recomendada não deve ultrapassar a dose máxima diária de três comprimidos por dia.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Indicações do produto

Carbonato De Cálcio + Vitamina D é um suplemento mineral e vitamínico indicado na prevenção ou no tratamento auxiliar na desmineralização óssea pré e pós menopausal.

Contra Indicações

Hipercalcemia.
Hiperparatiroidismo.
Hipervitaminose D.
Estado de má absorção.
Osteólise neoplásica.
Sarcoidose.
Aterosclerose.
Constipação intestinal.
Desidratação.
Hiperfosfatemia.
Litíase renal.
Calcificação metastática.
Doença renal.
Hipersensibilidade a crustáceos e frutos do mar.
Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Efeitos Colaterais

Embora raras, algumas reações adversas podem ser suficientemente graves e requerer tratamento médico especial. No caso de ocorrência de qualquer reação indesejável de maior gravidade, o uso de Carbonato De Cálcio + Vitamina D deve ser interrompido.

A seguir são listadas as reações adversas já relatadas durante o uso de Carbonato De Cálcio + Vitamina D:

Reações incomuns (> 1/1.000 e < 1/100):

Distúrbios gastrintestinais leves, como distensão abdominal, dor abdominal, constipação, diarreia, eructação, flatulência, náusea e vômito.

Reações raras (> 1/10.000 e < 1.000):

Hipercalcemia, hipercalcúria e nefrolitíase.

Reações muito raras (< 1/10.000):

Prurido, erupções cutâneas de curta duração e urticária.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem