

**Posologia****Exclusivo Pó para Suspensão Oral**

Como usar Cefadroxila pó para suspensão oral

Caso o seu médico tenha prescrito a forma líquida (pó para suspensão oral, o qual deve ser reconstituído), proceda da seguinte maneira:

Inicialmente, agite o frasco para dispensar o pó.

Retire a tampa do frasco.

Para preparar a suspensão, adicione cuidadosamente água filtrada até a linha gravada no corpo do frasco, logo acima do rótulo (observe a indicação na localização da linha no desenho abaixo).

Recoloque a tampa e agite o frasco novamente até que o pó se misture totalmente com a água.

Verifique se a mistura atingiu a linha gravada no corpo do frasco (isso é importante!), caso contrário, complete com água filtrada exatamente até a linha gravada.

Agite vigorosamente o líquido até que se forme uma suspensão homogênea.

Coloque a suspensão no dosador na quantidade (mL) indicada pelo médico. Caso a quantidade ultrapasse a marca desejada, recoloque o excesso no frasco. Lave o dosador após utilizá-lo.

Uma regra simples é tomar o produto às 8 horas da manhã e às 20 horas, no regime de duas vezes ao dia.

Lembre-se de agitar bem o frasco antes de cada nova administração.

Após a reconstituição, a suspensão oral de Cefadroxila ficará estável por 10 dias. Por isso, você deve conservá-la no refrigerador (em temperatura de 2°C a 8°C). Após 14 dias, a suspensão reconstituída deverá ser desprezada.

**Exclusivo Cápsula Dura**

As cápsulas de Cefadroxila devem ser engolidas inteiras com líquido e sem mastigar. As cápsulas não devem ser abertas.

**Posologia do Cefadroxila**

A Cefadroxila é ácido estável e pode ser administrada oralmente sem levar em consideração as refeições. A administração com alimentos pode ser útil na redução potencial de queixas gastrointestinais ocasionalmente associada à terapia oral com cefalosporinas.

**Adultos**

1 a 2 g por dia, fracionados em duas tomadas de 12 em 12 horas. Em algumas situações, a critério médico, Cefadroxila poderá ser administrada de 1 a 2 g em dose única diária.

**Cuidados de administração**

Para o tratamento de faringite ou amigdalite estreptocócicas beta-hemolíticas:

**Indicações do produto**

A Cefadroxila está indicada para o tratamento de infecções causadas por microorganismos sensíveis. A eficácia da Cefadroxila manifesta-se pela melhora do estado geral do paciente, incluindo a regressão da febre, dos sinais e sintomas da infecção.

**Exclusivo Pó para Suspensão Oral**

Nota: Testes de sensibilidade e cultura deverão ser realizados antes do início e durante a terapia. Estudos de função renal devem ser executados quando indicados. Procedimentos cirúrgicos devem ser conduzidos quando indicados.

**Contra Indicações**

formulação.

Usar com cautela a administração de Cefadroxila na gestação, lactação e em prematuros e recém-nascidos com idade inferior a seis semanas e meia.

**Exclusivo Cápsula Dura**

Categoria "B" de risco na gravidez.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

**Efeitos Colaterais**

Nesta lista, a frequência das reações está dividida da seguinte forma:

Reações muito comuns ( $\geq 1/10$ );

Reações comuns ( $< 1/10$  e  $\geq 1/100$ );

Reações incomuns ( $< 1/100$  e  $\geq 1/1.000$ );

Reações raras ( $< 1/1.000$  e  $\geq 1/10.000$ );

Reações muito raras ( $< 1/10.000$ ).

Reações comuns

Gastrointestinal

Diarreia.

Sistema gênito-urinário

Candidíase vulvovaginal.

Reações incomuns

Gastrointestinal

Epigastralgia, náuseas, vômitos, dispepsia.

Reações raras

Alterações em exames laboratoriais

Alterações em testes de função hepática, teste de Coombs temporariamente positivo.

Sistema imunológico

Reação semelhante à doença do soro, reação anafilática.

Gastrointestinal

Colite pseudomembranosa, hepatite medicamentosa, colite, colestase.

Sangue

Hipoprotrombinemia, plaquetopenia, agranulocitose, anemia hemolítica, hemorragia, eosinofilia.

Pele e anexos

Eritema multiforme, urticária, prurido, síndrome de Stevens-Johnsons.

Sintomas gerais

Febre, astenia.

**DCB-Denominação Comum Brasileira**

01825.