

Cianocobalamina (Vitamina B12)

Posologia

Cianocobalamina (Vitamina B12) 500 mcg/mL
1 ampola diariamente, intramuscular, ou de acordo com o critério médico.

Cianocobalamina (Vitamina B12) 2500 mcg/mL
1 ampola diariamente intramuscular, até remissão da dor ou a critério médico.

Indicações do produto

Cianocobalamina (Vitamina B12) 500 mcg/mL é indicado como coadjuvante terapêutico no alívio da dor lombar.

Cianocobalamina (Vitamina B12) 500 mcg/mL e Cianocobalamina (Vitamina B12) 250 mcg/mL são indicados para a prevenção e tratamento de uma variedade de afecções envolvendo deficiência desta vitamina, tais como:

Anemia perniciosa (por falta ou inibição do fator intrínseco);

Profilaxia e tratamento da deficiência vitamínica devido à nutrição idadequada ou má-absorção intestinal;

Como suplemento em pacientes que recebem nutrição parenteral.

Cianocobalamina (Vitamina B12) não deve ser administrado como suplemento dietético antes de assegurar-se de não se tratar de uma anemia perniciosa ou deficiência de ácido fólico.

Contra Indicações

Hipersensibilidade à vitamina B12.

Doença de Leber, pois têm-se produzido casos de atrofia do nervo óptico imediatamente após a administração, pois as concentrações de vitamina B12, neste caso, já são bastante elevadas.

Este medicamento é contra-indicado para uso por crianças.

Efeitos Colaterais

Raramente provoca toxicidade em indivíduos com função renal normal.

Pode provocar erupção cutânea ou prurido, sibilância (reação anafilática após a administração parenteral).

Em casos de eventos adversos notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem