

### Posologia

Dose usual para adultos e adolescentes

Tomar 2 copos medida de 30 ml meia hora antes do almoço (equivalente a 30 mg de alcalóides totais expressos em quinina e cinchonina).

Dose máxima diária

4 copos medidas de 30 ml ao dia (equivalente a 60 mg de alcalóides totais expressos em quinina e cinchonina).

### Indicações do produto

Este medicamento é indicado como estimulante do apetite.

### Contra Indicações

Este medicamento é contra-indicado:

Para uso por crianças e pacientes hipersensíveis a alcalóides da Cinchona, tais como, quinina ou quinidina;

Na gravidez e lactação, devido a ação citotóxica;

Nos casos de anemias extremas, devido ao risco de aparição de hemorragias;

Aos pacientes com gastrites e úlceras gastroduodenais;

Aos pacientes com labirintite e neurite ótica.

Devem ser avaliados os riscos/benefícios nos seguintes casos:

Não deve ser usado por pacientes que esteja usando anticoagulantes e cardiotônicos.

Gravidez

Risco de gravidez categoria X.

Estudos revelam anormalidades no feto ou evidências de risco para o feto. Os riscos durante a gravidez suplantam os potenciais benefícios. Não usar em hipótese alguma.

Este medicamento é contra-indicado para menores de 12 anos.

### Efeitos Colaterais

Reação incomum (>0,1% e < 1%)

Náuseas e vômitos.

Em indivíduos hipersensíveis pode provocar asma. Reações de hipersensibilidade, tais como alergia cutânea ou febre pode ocorrer.

Reação rara (>0,01% e < 0,1%)

Aumento da tendência a hemorragia, devido à redução no número de plaquetas do sangue (trombocitopenia). Em altas doses gera transtornos cardiovasculares, visuais, gástrico e neurológicos. A quinidina ocasionalmente pode originar efeitos imunoalérgicos que podem desencadear um bloqueio aurículo-ventricular.

Reação muito rara (< 0,01%)

Danos renais como anúria e uremia. Pode ocorrer trombocitopenia.

### DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem