

Posologia

Uso oral.

Adultos

1 flaconete (10mL), até 3 vezes por dia, antes das principais refeições, ou a critério médico.

Não ultrapasse as dosagens recomendadas, exceto com orientação médica.

Durante o tratamento, recomenda-se não ingerir bebidas alcoólicas.

Dose máxima diária recomendada

3 flaconetes/dia que equivalem a 3000mg/dia de colina, 1500mg/dia de betaína e 300mg/dia de metionina.

Indicações do produto

colina e betaína.

Indicado no tratamento dos distúrbios metabólicos hepáticos.

Contra Indicações

Este medicamento é contraindicado para pessoas hipersensíveis aos componentes da fórmula.

Este medicamento é contraindicado para pessoas portadas de doenças hepáticas graves, tais como cirrose hepática proveniente do consumo de álcool.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos de idade.

Efeitos Colaterais

Ao classificar a frequência das reações, utilizamos os seguintes parâmetros:

Reação muito comum (>1/10);

Reação comum (>1/100 e <1/10);

Reação incomum (>1/1.000 e <1/100);

Reação rara (>1/10.000 e <1/1.000);

Reação muito rara (<1/10.000).

Citrato de Colina + Betaína + Racemetionina (substâncias ativas) é bem tolerado.

Não há relatos de reações adversas relacionadas a seu uso nas doses recomendadas.

Reações raras

Prurido;

Cefaleia;

Distúrbios gástricos como náuseas e pirose.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem