

**Posologia**

Tomar um a dois comprimidos ao dia, via oral, preferencialmente antes da primeira refeição do dia. Esta posologia poderá ser modificada de acordo com o julgamento clínico.

A duração do tratamento com Cloreto De Potássio + Furosemida será determinada por prescrição médica.

**Indicações do produto**

Este medicamento é destinado ao tratamento de hipertensão arterial e edemas.

**Contra Indicações**

Cloreto De Potássio + Furosemida não deve ser usado em pacientes com:

Insuficiência renal com anúria;

Pré-coma associado à encefalopatia hepática;

Hipopotassemia severa;

Hiponatremia severa;

Hipovolemia (com ou sem hipotensão) ou desidratação;

Hipersensibilidade à furosemida, às sulfonamidas ou a qualquer componente da fórmula.

Este medicamento é contraindicado para uso por lactantes.

**Efeitos Colaterais**

Reação muito comum (>1/10);

Reação comum (>1/100 e ≤ 1/10);

Reação incomum (>1/1000 e ≤ 1/100);

Reação rara (>1/10000 e ≤ 1/1000);

Reação muito rara (≤ 1/10000);

Desconhecido: não pode ser estimada por dados disponíveis.

Distúrbios metabólico e nutricional

Muito comum:

Distúrbios eletrolíticos (incluindo sintomáticos), desidratação e hipovolemia, especialmente em pacientes idosos, aumento dos níveis séricos de creatinina e triglicérides.

Comum:

Hiponatremia, hipocloremia, hipocalcemia, aumento nos níveis séricos de colesterol e ácido úrico, crises de gota e aumento no volume urinário.

Incomum:

Tolerância à glicose diminuída; o diabetes mellitus pode se manifestar.

Desconhecido:

Hipocalcemia, hipomagnesemia, aumento nos níveis séricos de ureia e alcalose metabólica, Síndrome de Bartter no contexto do uso inadequado e/ou a longo prazo da furosemida..

Distúrbios vasculares

Raro:

Vasculite.

Desconhecido:

Trombose.

Distúrbio renal e urinário

Comum:

Aumento no volume urinário.

Raro:

Nefrite tubulointersticial.

**DCB-Denominação Comum Brasileira**

Não tem