

Cloridrato de Ambroxol

Posologia

ser administrado com ou sem alimentos.

Cloridrato de Ambroxol xarope pediátrico e solução somente devem ser administrados a pacientes pediátricos menores de 2 anos de idade sob prescrição médica.

Xarope adulto

Adultos e adolescentes maiores de 12 anos

5 ml por via oral, 3 vezes ao dia.

Este regime é adequado para o tratamento de doenças agudas do trato respiratório e para o tratamento inicial de condições crônicas até 14 dias.

Xarope pediátrico

Crianças abaixo de 2 anos

2,5 ml – 2 vezes ao dia

Crianças de 2 a 5 anos

2,5 ml - 3 vezes ao dia

Crianças de 6 a 12 anos

5 ml - 3 vezes ao dia

A dose de Cloridrato de Ambroxol xarope pediátrico pode ser calculada à razão de 0,5 mg de ambroxol por quilograma de peso corpóreo, 3 vezes ao dia.

Solução em gotas para uso oral ou por inalação:

O frasco de Cloridrato de Ambroxol gotas vem acompanhado de um moderno gotejador, de fácil manuseio: basta colocar o frasco em posição vertical e deixar gotejar a quantidade desejada.

Para usar:

Rompa o lacre da tampa.

Vire o frasco.

Mantenha-o na posição vertical; para começar o gotejamento, bata levemente com o dedo no fundo do frasco.

Indicações do produto

Cloridrato de Ambroxol é indicado para a terapia secretolítica e expectorante nas afecções broncopulmonares agudas e crônicas associadas à secreção mucosa anormal e transtornos do transporte mucoso.

Contra Indicações

outros componentes da fórmula.

Cloridrato de Ambroxol xarope adulto e pediátrico é contraindicado para o uso por

Efeitos Colaterais

Cloridrato de Ambroxol xarope e solução

Reações comuns ($\geq 1/100$ e $< 1/10$):

Disgeusia (distúrbios do paladar); hipoestesia da faringe; náusea; hipoestesia oral.

Reações incomuns ($\geq 1/1.000$ e $< 1/100$):

Vômitos; diarreia; dispepsia; dor abdominal; boca seca.

Reações raras ($\geq 1/10.000$ e $< 1/1.000$):

Garganta seca; erupção cutânea; urticária.

Reações com frequência desconhecida (não foi possível calcular a frequência a partir dos dados disponíveis):

Reação/choque anafilático; hipersensibilidade; edema angioneurótico; prurido.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

Cloridrato de Ambroxol 24 HRS

Reação comum ($\geq 1/100$ e $< 1/10$):

Náusea.

Reações incomuns ($\geq 1/1.000$ e $< 1/100$):

Vômitos; diarreia; dispepsia; dor abdominal.

Reações raras ($\geq 1/10.000$ e $< 1/1.000$):

Erupção cutânea; urticária.

Reações com frequência desconhecida (não foi possível calcular a frequência a partir dos dados disponíveis):

Reação/choque anafilático; hipersensibilidade; edema angioneurótico; prurido.

Atenção: Cloridrato de Ambroxol 24 HRS é um medicamento que possui nova forma farmacêutica no país e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, notifique os eventos adversos pelo Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

00632.