

### Posologia

Agite bem antes de usar.

Instilar 1 ou 2 gotas a cada 4 horas por um período aproximado de 7 dias. Durante as primeiras 24 a 48 horas, a dosagem pode ser aumentada para 1 ou 2 gotas a cada 2 horas, de acordo com o critério médico.

### Indicações do produto

microrganismos susceptíveis, quando for necessária a ação anti-inflamatória da dexametasona. Blefarites, blefaroconjuntivites e conjuntivites causadas por germes sensíveis incluindo *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* e *Streptococcus pneumoniae*.

### Contra Indicações

outras quinolonas. Também está contraindicado na ceratite por herpes simples, varíola, varicela e outras infecções oculares virais da córnea ou conjuntiva, afecções micóticas das estruturas oculares ou infecções parasitárias não tratadas e em infecções oculares por micobactérias.

### Efeitos Colaterais

classificadas de acordo com a seguinte convenção:

Muito comum ( $\geq 1/10$ );

Comum ( $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ );

Incomum ( $\geq 1/1.000$  a  $< 1/100$ );

Rara ( $\geq 1/10.000$  a  $< 1/1.000$ );

Muito rara ( $< 1/10.000$ ).

Dentro de cada grupo de frequência, as reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade.

Distúrbios do sistema nervoso

Comum

Dor de cabeça.

Distúrbios oculares

Muito comum

Irritação ocular.

Comum

Aumento da pressão intraocular, dor ocular, prurido ocular, sensação de corpo estranho nos olhos.

Incomum

Conjuntivite alérgica, visão turva, fotofobia, olhos secos, astenopia, hiperemia ocular.

Distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino

Incomum

Tosse, dor orofaríngea, irritação na garganta.

Distúrbios gastrointestinais

Comum

Disgeusia.

Incomum

Náusea.

Distúrbios na pele e tecido subcutâneo

Incomum

Irritação na pele.

### DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem