

Posologia

A solução já vem pronta para uso. Este medicamento é de uso tópico offálmico. Não encoste a ponta do frasco nos olhos, nos dedos e nem em outra superfície qualquer, para evitar contaminação do frasco e do colírio.

A dose recomendada para pacientes pediátricos, adultos e idosos é de 1 gota no saco conjuntival do(s) olho(s) afetado(s) 2 vezes ao dia, ou a critério médico.

O tratamento deve ser mantido até desaparecimento completo dos sintomas, ou durante o período de exposição (até que a estação alérgica tenha passado ou até que a exposição ao agente alérgico tenha terminado). Não há experiência de estudos clínicos com o uso de Cloridrato de Epinastina por mais de oito semanas.

Indicações do produto

Cloridrato de Epinastina é indicado para o tratamento e/ou prevenção de sinais e sintomas de conjuntivite alérgica sazonal.

Contra Indicações

produto.

Este medicamento é contraindicado para menores de 3 anos de idade.

Efeitos Colaterais

tratamento com Cloridrato de Epinastina foi menos de 10%. A maioria dos eventos adversos foi ocular e de intensidade leve; não foram observados eventos adversos graves.

As reações adversas oculares relatadas mais comumente com Cloridrato de Epinastina, por ordem de frequência foram

Reação comum (>1/100 e <1/10)

Sensação de ardor nos olhos e irritação nos olhos.

Reação incomum (>1/1.000 e <1/100)

Dor de cabeça, hiperemia conjuntival, secura ocular, distúrbios visuais, asma, irritação nasal, rinite, alteração do paladar, prurido nos olhos, secreção nos olhos.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem