

## Posologia

Modo de usar e Posologia Comprimidos

Adultos:

1 comprimido pela manhã e 1 comprimido à noite.

Dosagem máxima diária limitada a 2 comprimidos.

Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

Modo de usar e Posologia Solução oral

Crianças acima de 2 anos:

Duas gotas por kg de peso (como dose diária total), dividida em três vezes ao dia (1 mL = 20 gotas)

Dosagem máxima diária limitada a 60 gotas.

Modo de usar e Posologia Xarope

Adultos:

1 a 1 ½ copos-medida (10 a 15 ml), 3 a 4 vezes ao dia.

Crianças acima de 2 anos:

¼ a ½ copo-medida (2,5 a 5 ml), 4 vezes ao dia.

Dosagem máxima diária limitada a 60 mL.

## Indicações do produto

afecções das vias aéreas superiores e das manifestações alérgicas do sistema respiratório, tais como: coriza, rinite alérgica, prurido nasal, congestão nasal, alergia.

## Contra Indicações

quaisquer dos componentes de sua fórmula. Também não deve ser administrado em pacientes com hipertensão arterial grave, coronariopatias severas, arritmias cardíacas, glaucoma, hipertireoidismo e/ou hipertrofia prostática, devido à presença de amina simpaticomimética.

## Efeitos Colaterais

Reações devido à fenilefrina contida na formulação desse medicamento

Efeitos Cardíacos:

Hipertensão e arritmia cardíaca.

Efeitos Gastrointestinais:

Náuseas e vômitos.

Efeitos Neurológicos:

Cefaleia e vertigem.

Reações devido à bronfeniramina contida na formulação desse medicamento

Efeitos Gastrointestinais:

Secura da boca, nariz e garganta.

Efeitos Neurológicos:

Sonolência, diminuição dos reflexos, insônia, nervosismo e irritabilidade.

Efeito Oftálmico:

Visão turva.

Efeitos Respiratórios:

Espessamento das secreções brônquicas.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária NOTIVISA.

**DCB-Denominação Comum Brasileira**

Não tem