

Posologia

Instilar no ouvido de 5 a 10 gotas por vez, 1 a 4 vezes ao dia, até o desaparecimento da dor e do processo infeccioso.

Instrução de uso (aplicação no ouvido)

Após a reconstituição da solução, utilizar o produto, no máximo em 30 dias.

Desaperte a tampa do frasco.

Retire o batoque.

Quebre a ampola com pó e despeje-o no frasco.

Recoloque o batoque no frasco e feche-o com a tampa.

Agite o frasco e o produto estará pronto para o uso.

Recoloque a tampa no frasco para proteção.

Indicações do produto

Cloridrato de lidocaína + Sulfato de Neomicina + Hialuronidase é indicado no tratamento da otite, exceto a otite micótica.

Contra Indicações

Pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, principalmente, à neomicina.

Efeitos Colaterais

Ototoxicidade e nefrotoxicidade já foram relatadas com o uso tópico de neomicina.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm ou para Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem