

## Cloridrato de Nafazolina + Maleato de Mepiramina + Dexpantenol

### Posologia

Cloridrato de Nafazolina + Maleato de Mepiramina + Dexpantenol deve ser administrado via nasal.

Pediátrico (crianças a partir de 10 anos)

Pingar 1 a 2 gotas em cada narina da criança, que deve estar com a cabeça suavemente inclinada para trás, uma vez ao dia ou conforme prescrição médica.

Adultos

Nebulização Nasal

Realizar 1 a 2 nebulizações em cada narina, de 12 em 12 horas ou segundo orientação médica.

A nebulização deve ser feita com a cabeça suavemente inclinada para trás e o paciente deve inspirar quando comprimir o frasco.

Em caso de ingestão acidental, principalmente por crianças, procure imediatamente um centro de intoxicação.

### Indicações do produto

congestão nasal de origem alérgica ou inflamatória, nas rinites e rinosfarngites. Também indicado para o tratamento auxiliar da congestão nasal provocada por gripes e resfriados.

### Contra Indicações

Cloridrato de Nafazolina + Maleato de Mepiramina + Dexpantenol é contra-indicado a pacientes portadores de hipertireoidismo ou hipertensão e aos pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Cloridrato de Nafazolina + Maleato de Mepiramina + Dexpantenol também é contra-indicado após a hipofisectomia transesfenoidal ou após cirurgias oronasais em que ocorra exposição da dura-máter.

Este medicamento é contra-indicado para menores de 10 anos.

### Efeitos Colaterais

Cloridrato de Nafazolina + Maleato de Mepiramina + Dexpantenol pode provocar sonolência, sensação de ressecamento da mucosa nasal, sensação de pontada, de queimadura, espirro, rinorréia, perda do olfato.,

Em caso de uso prolongado, pode produzir rinite atrófica.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária-NOTIVISA, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

### DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem