

Posologia**Hipertensão****Adultos**

A dose recomendada é de 1 comprimido (5 mg) ao dia, de preferência à mesma hora do dia. Os comprimidos podem ser tomados junto com as refeições.

A redução da pressão arterial é evidente após 1-2 semanas de tratamento. Ocasionalmente, o efeito ótimo só é atingido ao final de 4 semanas.

Associação com outros agentes anti-hipertensivos

Os betabloqueadores podem ser utilizados isolados ou em associação com outros agentes antihipertensivos.

Até o momento, apenas foi observado um efeito anti-hipertensivo aditivo quando associado 5 mg de Cloridrato de Nebivolol com 12,5 - 25 mg de hidroclorotiazida.

Pacientes com insuficiência renal

Nos pacientes com insuficiência renal, a dose inicial recomendada é 2,5 mg por dia. Se necessário, a dose diária pode ser aumentada até 5 mg.

Pacientes com insuficiência hepática

A informação disponível sobre pacientes com insuficiência hepática ou com função hepática diminuída é limitada. Por isso, o uso de Cloridrato de Nebivolol nestes pacientes está contraindicado.

Idosos

Nos pacientes com mais de 65 anos, a dose inicial recomendada é de 2,5 mg por dia. Se necessário a dose diária pode ser aumentada para 5 mg. Contudo, devido à pouca experiência em pacientes com idade superior a 75 anos, devem ser tomadas precauções e proceder a uma monitorização rigorosa destes pacientes.

Crianças e adolescentes

A eficácia e segurança de Cloridrato de Nebivolol em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos não foi estabelecida. Não existem dados disponíveis. Portanto, o uso em crianças e adolescentes não é recomendado.

Insuficiência cardíaca (IC)

O tratamento da insuficiência cardíaca deve ser iniciado com um ajuste posológico gradual até que a dose ótima individual de manutenção seja alcançada.

Indicações do produto**Hipertensão**

Tratamento da hipertensão arterial (hipertensão em todos os estágios).

Insuficiência cardíaca (IC)

Tratamento da insuficiência cardíaca em associação com as terapêuticas padronizadas em pacientes idosos com idade ≥ 70 anos e com fração de ejeção $\leq 35\%$.

Contra Indicações

Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a algum dos excipientes;

Insuficiência ou função hepática diminuída;

Insuficiência cardíaca aguda, choque cardiogênico ou episódios de descompensação da insuficiência cardíaca que requerem terapêutica inotrópica por via I.V.

Adicionalmente, tal como outros agentes betabloqueadores, Cloridrato de Nebivolol é contraindicado nas seguintes situações:

Doença do nó sinusal, incluindo o bloqueio sino-auricular;

Bloqueio cardíaco de segundo e terceiro grau (sem marcapasso);

História de broncospasmo e asma;

Feocromocitoma não tratado;

Acidose metabólica;

Bradycardia (frequência cardíaca < 60 b.p.m. antes do início do tratamento);

Hipotensão arterial (pressão arterial sistólica < 90 mmHg);

Perturbações circulatórias periféricas graves.

Efeitos Colaterais

Hipertensão

As reações adversas relatadas, que são na maioria dos casos de intensidade leve a moderada, estão classificadas no quadro e ordenadas pela sua frequência:

Classes de Sistemas de Órgãos

Comum ($\geq 1/100$ a $< 1/10$) Incomum ($\geq 1/1000$ a $\leq 1/100$) Muito rara ($\leq 1/10.000$)

Desconhecido

Doenças do sistema imunológico

- - -

Edema angioneurótico, hipersensibilidade

Doenças psiquiátricas

- Pesadelos, depressão - -

Doenças do sistema nervoso

Cefaleias, tonturas, parestesia - Síncope -

Afeções oculares

- Diminuição da visão - -

Cardiopatias

- Bradicardia, insuficiência cardíaca, redução da condução AV/bloqueio AV - -

Vasculopatias

- Hipotensão, claudicação intermitente - -

Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino

Dispneia Broncoespasmo - -

Doenças gastrintestinais

Obstipação, náusea e diarreia Dispepsia, flatulência, vômitos - -

Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos

DCB-Denominação Comum Brasileira

06255.