

Posologia**Dose Omitida**

Caso o paciente esqueça-se de utilizar Cloridrato de Oxitetraciclina + Sulfato de Polimixina B no horário estabelecido, deve fazê-lo assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de usar a próxima dose, deve desconsiderar a dose esquecida e utilizar a próxima, continuando normalmente o esquema de doses recomendado pelo seu médico. Neste caso, o paciente não deve utilizar a dose duplicada para compensar doses esquecidas. O esquecimento de dose pode comprometer a eficácia do tratamento.

Posologia do Cloridrato de Oxitetraciclina + Sulfato de Polimixina B**Pomada Oftálmica**

A pomada deverá ser aplicada em pequena quantidade (aproximadamente 1 cm), dentro do saco conjuntival da pálpebra inferior, 4 a 6 vezes ao dia, até a cura completa da infecção. A duração do tratamento pode variar de um dia até várias semanas, dependendo da natureza e da gravidade da infecção.

No caso de blefarite, escamas e crostas devem ser removidas antes da aplicação da pomada. Na profilaxia, o mesmo procedimento deve ser adotado no dia anterior à operação e por vários dias subsequentes.

O paciente deve ser instruído a tomar cuidado para não contaminar o orifício da bisnaga durante a aplicação do medicamento.

Pomada Dermatológica

O contato da pomada com as áreas infectadas deve ser contínuo, podendo a duração do tratamento variar de alguns dias até várias semanas, dependendo da natureza e gravidade da infecção. Uma vez que os organismos causadores podem reaparecer se a terapia for interrompida muito cedo, o tratamento deve prolongar-se até a cura completa das lesões.

Cloridrato de Oxitetraciclina + Sulfato de Polimixina B deve ser utilizada apenas topicamente (não deve ser utilizada em cavidades do corpo), da seguinte forma:

Após cuidadosa e completa limpeza das áreas afetadas, a pomada deve ser aplicada diretamente nas áreas afetadas, utilizando uma gaze esterilizada.

Repetir este procedimento pelo menos duas ou três vezes ao dia.

Indicações do produto**Pomada Oftálmica**

Cloridrato de Oxitetraciclina + Sulfato de Polimixina B pomada oftálmica é indicada no tratamento de infecções oculares superficiais, envolvendo a conjuntiva e/ou a córnea, devido à microrganismos suscetíveis.

Pomada Dermatológica

Cloridrato de Oxitetraciclina + Sulfato de Polimixina B pomada tópica é indicada para a profilaxia e tratamento tópico das infecções cutâneas localizadas, tais como pioderma, dermatite pustular e feridas menores infectadas ou queimaduras, causadas por micro-organismos suscetíveis.

Contra Indicações

polimixina B.

Efeitos Colaterais

Distúrbios do sistema imune
Hipersensibilidade.

Distúrbios da pele e tecido subcutâneo
Dermatite de contato.

Exclusivo Pomada Oftálmica
Distúrbios do sistema nervoso
Sensação de queimação.

Distúrbios da visão
Aumento do lacrimejamento.

Distúrbios gerais e condição no local da administração
Dor, sensação de corpo estranho.

Atenção: Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

Exclusivo Pomada Dermatológica
A oxitetraciclina tópica é um antibiótico de baixa toxicidade. Reações alérgicas, incluindo dermatite de contato, devido à hipersensibilidade ao fármaco, têm sido relatadas. Caso tais reações ocorram, o tratamento deverá ser interrompido.

Atenção: Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem