

## Posologia

Ingerir um comprimido revestido, contendo 312,5 mg (equivalente a 3,125 mg de derivados ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico) do extrato padronizado três vezes ao dia, ou a critério médico.

Não há restrição quanto ao tempo de utilização do medicamento, caso os sintomas persistam consulte seu médico.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico.

Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

## Indicações do produto

da bile.

## Contra Indicações

Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula não devem fazer uso do produto. Este medicamento é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade a extratos de Cynara Scolymus L. ou outras plantas da família Asteraceae.

Não deve ser utilizado por pacientes com doença obstrutiva das vias biliares. Pacientes que apresentam cálculos biliares devem consultar um médico antes da utilização da Cynara Scolymus L..

O medicamento deve ser evitado por menores de 12 anos de idade e durante a gravidez devido à falta de estudos com Cynara Scolymus L. em crianças e gestantes.

Este medicamento não é indicado durante a amamentação devido à falta de estudos com o medicamento em lactantes.

Os princípios ativos amargos da planta podem passar pelo leite materno.

## Efeitos Colaterais

O uso deste medicamento pode acarretar efeito laxativo.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

## DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem