

#### Posologia

Este medicamento não deve ser utilizado por via de administração não recomendada.

Este medicamento só deve ser utilizado por via tópica.

O modo de uso consiste em triturar e diluir um tablete em 2,5ml de álcool 96% ou 25ml de álcool-gel o 40 GL, e aplicar a preparação sobre a área afetada.

#### Indicações do produto

Cânfora é indicada como rubefaciente para o alívio dos sintomas de processos inflamatórios.

#### Contra Indicações

A Cânfora não deve ser usada por pacientes com hipersensibilidade conhecida a cânfora.

Produtos tópicos a base de cânfora são contra-indicados para crianças menores de 2 anos.

Este medicamento é contra-indicado para uso por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista [Categoria C].

#### Efeitos Colaterais

A ingestão acidental de cânfora pode causar náusea, vômito, cólica, dor de cabeça, tontura, sensação de calor, ardor, contração muscular, convulsões epiléticas, depressão do sistema nervoso central e coma. Foi relatado um colapso instantâneo após a aplicação local de cânfora nas narinas.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em [www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm](http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm), ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

#### DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem