

Posologia

Se possível, Desoximetasona + Sulfato de Neomicina deve ser aplicado suavemente na pele.

Aplicar Desoximetasona + Sulfato de Neomicina 1 a 2 vezes ao dia e em casos mais graves, a critério médico, 3 vezes ao dia.

Aplicar pequena quantidade e espalhar pela pele. Após melhora do quadro clínico a dose pode ser reduzida gradativamente.

A aplicação em grandes áreas (superior a aproximadamente 10% da superfície corporal) e terapias prolongadas (período superior a 4 semanas) deverão ser evitadas. Ambos os casos levam a um risco de efeito corticosteroide sistêmico.

Adicionalmente, a terapia prolongada está também associada a um risco pronunciado dos efeitos adversos locais.

Não há estudos dos efeitos de Desoximetasona + Sulfato de Neomicina administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para garantir a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via tópica.

Erro de Dosagem

Caso ocorra um pequeno desvio no esquema posológico (por exemplo: aplicação em uma área maior ou em excessiva quantidade, aplicação muito frequente ou um pequeno erro de dosagem) não causará prejuízo ao tratamento.

Indicações do produto

Desoximetasona + Sulfato de Neomicina apresenta em sua formulação a desoximetasona, um esteroide tópico de ação anti-inflamatória e antipruriginosa, associado à neomicina, um antibacteriano de amplo espectro eficaz no combate a infecções bacterianas secundárias.

Este medicamento é destinado ao tratamento de dermatoses que devam ser tratadas por corticoides tópicos secundariamente infectadas por bactérias, tais como: eczemas, psoríase, neurodermatite, queimaduras de 1º grau, dermatite solar e outras

Contra Indicações

Desoximetasona + Sulfato de Neomicina não deve ser utilizado nos olhos (vide "Advertências e Precauções") e em pacientes com hipersensibilidade conhecida a desoximetasona, sulfato de neomicina, e a outros corticosteroides derivados da betametasona ou a qualquer componente da fórmula.

Desoximetasona + Sulfato de Neomicina contém uma parafina em sua fórmula, que pode causar vazamento ou ruptura de preservativos de látex (camisinha). Portanto, o contato entre Desoximetasona + Sulfato de Neomicina e preservativos de látex deve ser evitado, pois a segurança proporcionada pelo preservativo pode estar prejudicada.

Desoximetasona + Sulfato de Neomicina não deve ser utilizado em reações cutâneas consequentes de vacinações e manifestações cutâneas consequentes à sífilis, tuberculose, infecções virais (por exemplo, varicela), rosácea e dermatite perioral devido ao risco de agravamento.

Gravidez e Lactação

Devido ao risco de absorção sistêmica da desoximetasona, a aplicação tópica de Desoximetasona + Sulfato de Neomicina em áreas extensas é contraindicada durante a gravidez e lactação. Entretanto, se o médico considerar necessário o uso de Desoximetasona + Sulfato de Neomicina, este pode ser aplicado apenas em uma pequena área da pele.

Categoria de risco na gravidez: D. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez

Efeitos Colaterais

As seguintes reações adversas podem ser observadas na região em que o produto foi aplicado:

Foliculite;

Hipertricose;

Acne;

Hiper ou hipopigmentação;

Telangiectasias;

Estrias por distensão;

Atrofia e maceração da pele.

Estes efeitos tópicos ocorrem especialmente quando o tratamento é prolongado ou utiliza-se curativos oclusivos. Desoximetasona + Sulfato de Neomicina raramente leva a uma reação de hipersensibilidade no local da pele.

Quantidades sistemicamente ativas de desoximetasona podem ser absorvidas se Desoximetasona + Sulfato de Neomicina for usado sobre grandes áreas, por período prolongado ou sob curativos oclusivos.

Distúrbios visuais

Desconhecido: visão turva e coriorretinopatia.

Distúrbios nutricionais e metabólicos

Desconhecido: hiperglicemia.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem