

### **Posologia**

comprimido de Dicloridrato de Buclizina deve ser administrado por via oral com água, antes das refeições.

Uso adulto

1 comprimido meia hora antes do almoço e 1 comprimido meia hora antes do jantar.

Uso em crianças de 6 a 12 anos

Meio comprimido meia hora antes do almoço e meio comprimido meia hora antes do jantar. Deve haver acompanhamento médico regular durante o tempo de uso do medicamento nessa faixa etária.

Não há estudos dos efeitos de Dicloridrato de Buclizina administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para garantir a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral.

### **Indicações do produto**

Este medicamento é indicado como estimulante do apetite.

### **Contra Indicações**

Na posologia recomendada, não existem contraindicações específicas. Tendo em vista a inexistência de dados referentes ao efeito sobre a gestação, o uso de Dicloridrato de Buclizina é contraindicado em mulheres grávidas e lactantes.

Categoria de risco na gravidez C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

### **Efeitos Colaterais**

Às vezes pode ocorrer sonolência diurna, geralmente no início do tratamento.

Dados de Farmacovigilância têm demonstrado a ocorrência de alguns casos de: tontura, dor de cabeça, vômito, náusea, dispneia, insônia, diarreia e rash macular.

### **DCB-Denominação Comum Brasileira**

01503.