

**Posologia**

## Montagem do frasco

Retire a tampa do frasco do Dicloridrato de Hidroxizina Xarope.

Encaixe o bico adaptador (fornecido com a seringa) na boca do frasco, pressionando-o até que fique perfeitamente ajustado (uma vez colocado, não retirá-lo).

## Como administrar

Encaixe a seringa dosadora no bico adaptador que foi colocado na boca do frasco.

Vire o frasco de cabeça para baixo e puxe o êmbolo da seringa até atingir a quantidade prescrita pelo médico (dose).

Administre a dose contida na seringa diretamente na boca do paciente, empurrando o êmbolo até o final.

Após o uso, desmontar a seringa, retindo o seu êmbolo e lavar bem com água corrente. Feche bem o frasco. Guarde a seringa em um lugar limpo para que possa ser utilizado novamente.

## Peso Corpóreo

## Dose anti-histamínica

6 a 8 kg

2,0 a 3,0mL de Dicloridrato de Hidroxizina xarope/tomada

8 a 10 kg

3,0 a 3,5mL de Dicloridrato de Hidroxizina xarope/tomada

10 a 12 kg

3,5 a 4,0mL de Dicloridrato de Hidroxizina xarope/tomada

12 a 24 kg

4,0 a 8,5mL de Dicloridrato de Hidroxizina xarope/tomada

24 a 40 kg

8,5 a 14,0mL de Dicloridrato de Hidroxizina xarope/tomada

## Dosagem

## Adultos:

25 mg, 3 a 4 vezes ao dia (a cada 6-8 horas).

## Crianças:

0,7 mg/Kg de peso, 3 vezes ao dia (a cada 8 horas).

Tratamento restrito a 10 dias para adultos e crianças com idade superior a 6 anos ou conforme orientação médica.

Utilizar Dicloridrato de Hidroxizina Xarope apenas por via oral. O uso deste medicamento por outra via, que não a oral, pode causar a perda do efeito esperado ou mesmo promover danos ao seu usuário.

Caso o produto entre em contato com a pele no momento da administração lave o local abundantemente com água, pois o uso tópico está contraindicado e pode causar sensibilização da pele e dermatite de contato.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

## Comprimido

## Adultos

**Indicações do produto**

Dicloridrato de Hidroxizina é um auxiliar no tratamento do prurido causado por condições alérgicas da pele, tais como urticária, dermatite atópica e de contato, e do prurido decorrente de outras doenças sistêmicas.

**Contra Indicações**

## fórmula.

## Gravidez e lactação

O uso de hidroxizina é contraindicado durante estas condições. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe seu médico se está amamentando.

Categoria C de risco na gravidez: não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou cirurgião-dentista.

Este medicamento é contraindicado para menores de 6 meses.

O uso de anti-histamínicos não é recomendado em prematuros e recém-nascidos, por serem mais susceptíveis aos eventos adversos relacionados ao Sistema Nervoso Central.

Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas.

Exclusivo Xarope: Atenção: Este medicamento contém sacarose, portanto deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.

Exclusivo Comprimido: Atenção: Este medicamento contém lactose.

**Efeitos Colaterais**

Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)

Sedação, sonolência e xerostomia (secura na boca). Geralmente são de caráter moderado e transitório (pode desaparecer após vários dias de terapia continuada).

Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento)

Sintomas gastrointestinais como náusea, vômito, dor epigástrica, diarreia ou constipação.

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento)

Crises convulsivas, tremor e agitação.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos – VIGIMED, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

Exclusivo Xarope

Caso o produto entre em contato com a pele no momento da administração lave o local abundantemente com água, pois o uso tópico pode causar sensibilização da pele e dermatite de contato.

#### **DCB-Denominação Comum Brasileira**

Não tem