

**Posologia**

## Posologia

Dimenidrinato comprimido

Acima de 12 anos

Um comprimido a cada quatro a seis horas, não excedendo 400 mg (quatro comprimidos) de Dimenidrinato em 24 horas.

Dimenidrinato solução oral

Crianças acima de 2 anos de idade e adultos

1,25 mg de Dimenidrinato/ kg de peso corporal, o que corresponde a 0,5 ml da solução/kg de peso corporal, não excedendo a dose máxima diária, conforme a tabela abaixo

Faixa etária

Posologia e frequência

Crianças de 2 a 6 anos

5 a 10 ml (12,5 a 25 mg) a cada 6 a 8 horas, não excedendo 30 ml (75 mg) em 24 horas

Crianças de 6 a 12 anos

10 a 20 ml (25 a 50 mg) a cada 6 a 8 horas, não excedendo 60 ml (150 mg) em 24 horas

Adultos acima de 12 anos

20 a 40 ml (50 a 100 mg) a cada 4 a 6 horas, não excedendo 160 ml (400 mg) em 24 horas

Na insuficiência hepática

Deve-se considerar redução da dose em pacientes com insuficiência hepática aguda, uma vez que o Dimenidrinato é intensamente metabolizado pelo fígado.

**Indicações do produto**

Profilaxia e tratamento de náuseas e vômitos em geral, dentre os quais:

Náuseas e vômitos da gravidez;

Náuseas, vômitos e tonturas causados pela doença do movimento – cinetose;

Náuseas e vômitos pós-tratamentos radioterápicos e em pré e pós-operatórios, incluindo vômitos pós cirurgias do trato gastrointestinal.

No controle profilático e na terapêutica da crise aguda dos transtornos da função vestibular e ou vertiginosos, de origem central ou periférica, incluindo labirintites.

**Contra Indicações**

Hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

O Dimenidrinato é contraindicado para pacientes porfíricos.

O Dimenidrinato solução oral é contraindicado para menores de 2 anos.

O Dimenidrinato comprimido é contraindicado para menores de 12 anos.

**Efeitos Colaterais**

Este medicamento pode causar as seguintes reações adversas:

Reação muito comum (&gt; 1/10)

Sedação e sonolência.

Reação comum (&gt; 1/100 e &lt; 1/10)

Cefaleia.

Reação muito rara (&lt; 1/10.000)

Relatos isolados de erupção cutânea fixa e púrpura anafilática.

O Dimenidrinato pertence a uma classe de anti-histamínicos que também pode causar efeitos antimuscarínicos, como por exemplo visão turva, boca seca e retenção urinária.

Outras reações adversas que podem ser causadas por esta classe de medicamentos são tontura, insônia e irritabilidade. Porém, especificamente para o Dimenidrinato, a documentação de tais sintomas na literatura científica é pobre ou inexistente.

Em caso de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em

<http://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmCadastro.asp>, ou a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.**DCB-Denominação Comum Brasileira**

03051.