

Posologia

Uso oral.

Na doença venosa crônica, a posologia usual é de 2 comprimidos revestidos ao dia:

De preferência durante as refeições.

Na crise hemorroidária aguda:

6 comprimidos revestidos ao dia durante os quatro primeiros dias e, em seguida, 4 comprimidos revestidos ao dia durante três dias.

A dose máxima recomendada é de 6 comprimidos ao dia.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Indicações do produto

Tratamento das manifestações da insuficiência venosa crônica, funcional e orgânica dos membros inferiores;

Tratamento dos sintomas funcionais relacionados à insuficiência venosa do plexo hemorroidário.

Contra Indicações

Diosmina + Hesperidina não deve ser utilizado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Este medicamento é contraindicado para o uso em crianças.

Categoria B: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Efeitos Colaterais

Os seguintes eventos adversos foram reportados e estão classificados usando a seguinte frequência:

Muito comuns (>1/10);

Comuns (>1/100 e <1/10);

Reação incomum (>1/1.000 e <1/100);

Reação rara (>1/10.000 e <1/1.000);

Reação muito rara (<1/10.000);

Reações com frequência desconhecida (não pode ser estimada pelos dados disponíveis).

Reações comuns (>1/100 e <1/10)

Diarreia, dispepsia, náuseas e vômitos.

Reações incomuns (>1/1.000 e <1/100)

Colite.

Reações raras (>1/10.000 e <1/1.000)

Tontura, dor de cabeça, mal estar, erupção, prurido e urticária.

Reações com frequência desconhecida

Edema de face isolada, lábios e pálpebras. Excepcionalmente edema de Quincke.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em

<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem