

Posologia**Xarope Adulto**

Adultos e crianças acima de 12 anos
1 copo-medida (10 mL), 4 vezes ao dia.

Xarope Pediátrico

Crianças acima de 3 anos
1 copo-medida (10 mL), 4 vezes ao dia.

Crianças de 2 a 3 anos
¼ a ½ copo-medida, 4 vezes ao dia.

Gotas

Adultos
30 gotas, 4 vezes ao dia.
Crianças acima de 3 anos

15 gotas, 4 vezes ao dia.

Crianças de 2 a 3 anos
4 a 8 gotas, 4 vezes ao dia.

Em caso de esquecimento o paciente deve ser orientado a esperar até o horário de tomada da próxima dose. O paciente deve ser orientado a não tomar mais do que a dose normal prescrita.

Indicações do produto

Este medicamento é destinado ao tratamento sintomático da tosse improdutiva ou exagerada, irritativa, espasmódica e seca, causadas por processos inflamatórios, infecciosos, irritativos e alérgicos das vias aéreas superiores e brônquicas.

Contra Indicações

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com sensibilidade conhecida a Dropropizina ou a qualquer componente de sua formulação.

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com insuficiência respiratória severa, hipotensão e por pacientes asmáticos.

Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos de idade.

Como qualquer outro antiitussígeno, este medicamento é contraindicado quando a tosse for necessária para expectoração de

Efeitos Colaterais

Raramente são observadas reações adversas com as doses terapêuticas recomendadas. Em caso de doses elevadas ou de hipersensibilidade, as reações mais frequentes são hipotensão ortostática, náusea, sonolência, rash e eritema.

Em caso de eventos adversos, notifique o Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

DCB-Denominação Comum Brasileira

03248.