

Posologia

Informações para abertura do lacre
Perfurar o lacreda bisnaga com o lado externo da tampa.

Posologia do Escina + Salicilato de Dietilamônio
Uso tópico local.

Aplicar pequena quantidade sobre a região afetada, duas ou três vezes ao dia. Não aplique mais que 20g de Escina + Salicilato de Dietilamônio por dia.

Após aplicar Escina + Salicilato de Dietilamônio sobre a pele, é necessário aguardar alguns minutos antes da aplicação de algum curativo. A utilização de um curativo oclusivo não é recomendada.

Indicações do produto

Escina + Salicilato de Dietilamônio é indicado em todos os casos de edema localizados, causados por transtornos de natureza inflamatória, tais como:

Afecções venosas: flebites superficiais, inflamações varicosas;

Afecções reumáticas: artrites, artroses, periartrites, bursite. Quadros dolorosos da coluna vertebral, torcicolo;

Traumatismos, contusões, luxações, hematomas, tendinite, tenossinovite;

Lesões leves oriundas da prática esportiva e dores musculares, pois inibe a formação de edema e combate os sintomas dele resultantes, como dores, sensações de peso, calor e rubor.

Contra Indicações

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Escina + Salicilato de Dietilamônio não deve ser aplicado na pele rachada, em membranas mucosas ou em áreas de pele que tenham sido expostas a radioterapia.

Efeitos Colaterais

reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento):

Podem ocorrer manifestações alérgicas de pele (exemplos: pele seca, rash, eritema, dermatite, prurido, esfoliação de pele e urticária.).

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. Informe também a empresa através

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem