

Posologia**Solução Oftálmica**

Este medicamento é de uso tópico ocular.

Pacientes devem ser instruídos a não encostar a ponta do frasco nos olhos, nos dedos e nem em outra superfície qualquer, para evitar a contaminação do frasco e do colírio.

A dose recomendada para inflamação no segmento anterior do olho pós trabeculoplastia por laser é de uma gota instilada no saco conjuntival a cada quatro horas durante uma semana ou durante duas a três semanas após outros procedimentos cirúrgicos.

A dose recomendada para a inibição da miose transoperatória é de um total de quatro gotas no olho, sendo uma gota a aproximadamente cada 1/2 hora, começando duas horas antes da cirurgia.

Pastilha

Adultos e crianças com 12 anos ou mais

Dissolver uma pastilha lentamente na boca, a cada 3 a 6 horas, ou conforme necessidade. Máximo de 5 pastilhas em um período de 24 horas. Recomenda-se não utilizar por mais de 3 dias.

Crianças

Não indicado para crianças abaixo de 12 anos de idade.

Idosos

Uma recomendação geral de dose para idoso não pode ser fornecida, já que até o momento a experiência clínica neste grupo etário é limitada. Idosos apresentam maior risco para reações adversas.

Para administração via mucosa oral, por tempo determinado.

Como qualquer pastilha, para evitar irritação local, Flurbiprofeno pastilhas deve ser movimentada pela boca enquanto é dissolvida. Se ocorrer irritação da mucosa, o tratamento deve ser descontinuado.

O tratamento deve ser administrado pelo menor período possível, a fim de evitar reações adversas.

Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

Indicações do produto

Flurbiprofeno é indicado para o tratamento de pacientes com inflamação no segmento anterior do olho pós cirurgia e pós trabeculoplastia por laser.

Flurbiprofeno também é indicado para a inibição da miose transoperatória.

Pastilha

Flurbiprofeno pastilhas é um medicamento indicado para a inflamação da garganta, proporcionando alívio sintomático por até 3 horas.

Contra Indicações

Flurbiprofeno é contraindicado em pacientes com história de hipersensibilidade à substância ativa.

Pastilha

Flurbiprofeno é contraindicado em caso de:

Hipersensibilidade ao Flurbiprofeno;

Pacientes com hipersensibilidade prévia ao ibuprofeno, ácido acetilsalicílico ou outros AINEs (asma, broncoespasmo, rinite, angioedema ou urticária);

Existência ou histórico de úlcera péptica ou hemorrágica (dois ou mais episódios distintos de ulceração comprovados), ou ulceração intestinal;

Histórico de sangramento ou perfuração gastrointestinal, colite grave, distúrbios hemorrágicos ou hematopoéticos relacionados com terapia prévia com AINEs;

Durante o último trimestre de gravidez;

Falência cardíaca, renal ou hepática graves.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou lactantes sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Efeitos Colaterais

As reações adversas observadas nos estudos clínicos realizados com Flurbiprofeno, por ordem de frequência foram:

Reação muito comum (> 1/10):

Queimação e ardência / hifema

Reação comum (> 1/100 e < 1/10):

Ardência temporária

Outras reações adversas foram identificadas durante o uso pós-comercialização na prática clínica

Esses relatos são voluntários e de uma população de tamanho incerto, portanto não é sempre possível estimar a frequência dessas reações. As reações foram incluídas devido a uma combinação de frequência dos relatos e / ou possível conexão causal com Flurbiprofeno.

Distúrbios oculares:

Hemorragia ocular, hifema, midríase (midríase prolongada) e hiperemia ocular

Atenção: Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

Pastilha

Reações de hipersensibilidade aos AINEs foram reportadas e consistem em reações alérgicas não-específicas e anafilaxia; reações do trato respiratório como asma, exacerbação da asma, broncoespasmo e dispnéia; várias reações dérmicas, como prurido, urticária, angioedema, e, mais raramente, dermatoses exfoliativa e bolhosa (incluindo necrólise epidérmica e eritema multiforme).

As listas abaixo de eventos adversos dizem respeito ao uso de Flurbiprofeno em doses comercializadas como isentas de prescrição médica, em uso por curto período de tempo.

Reações Muito comuns (>10%)

Oral:

Calor e sensação de queimação na boca.

Reações Comuns (>1/10 ou > 10%)

Sistema Nervoso:

Tontura, cefaleia, parestesia.

Respiratórias, torácicas e mediastinais:

DCB-Denominação Comum Brasileira

04209.