

Posologia

Furoato de Mometasona é indicado para uso dermatológico.

Não fazer curativos sobre a aplicação (curativos oclusivos), a não ser por indicação médica.

No caso de esquecimento de alguma dose, oriente seu paciente a aplicar a medicação assim que possível e a manter o mesmo horário da aplicação até o término do tratamento.

Dosagem:

Uma fina camada de Furoato de Mometasona deverá ser aplicada de modo a cobrir toda a área afetada, uma vez por dia.
Cápsula

Uso inalatório por via oral.

Atenção: não engula as cápsulas. Use exclusivamente para inalação por via oral. Não divida o medicamento com outra pessoa, nem use esse medicamento para outras doenças.

Furoato de Mometasona destina-se ao uso em adultos e em crianças a partir de 12 anos.

As cápsulas só devem ser retiradas do blister imediatamente antes do uso. É importante para o paciente entender que, durante a perfuração, a cápsula de gelatina pode fragmentar-se e que pequenos pedaços de gelatina podem atingir a boca ou a garganta após a inalação.

Para usar o inalador, proceda do seguinte modo:

Retire a tampa (figura 1).

Segure firmemente a base do inalador e, para abrir, gire o bocal na direção indicada pela seta (figura 2).

Remova a cápsula do blister, levantando e puxando a aba de alumínio. É importante que a cápsula somente seja retirada do blister imediatamente antes do uso (figura 3).

Coloque a cápsula no compartimento adequado, na base do inalador (figura 4).

Mantenha o inalador em posição vertical, pressione os botões laterais completamente, uma só vez, acompanhando visualmente a perfuração das duas extremidades da cápsula (figura 5).

Solte os botões e, em seguida, pressione levemente um deles, empurrando um dos lados da cápsula para certificar-se de que ela se encontra solta no fundo do compartimento. Soltar a cápsula é uma operação que garante a eficácia da aspiração, pois durante a perfuração a cápsula pode ficar presa no fundo do compartimento (figura 6).

Gire o bocal de volta para a posição fechada (figura 7).

Solte o máximo de ar dos pulmões (figura 8).

Indicações do produto

Creme / Pomada

Furoato de Mometasona é indicado para o alívio das manifestações inflamatórias e pruriginosas das dermatoses sensíveis aos corticosteroides como psoríase, dermatite atópica e/ou dermatite alérgica de contato.

Cápsula

Furoato de Mometasona é indicado para o controle dos sinais e sintomas no tratamento e na profilaxia da asma de qualquer intensidade, inclusive no tratamento dos pacientes asmáticos dependentes de corticosteroides inalatórios ou sistêmicos, e de pacientes asmáticos não dependentes de corticosteroides, porém inadequadamente controlados com outros esquemas de tratamento.

Contra Indicações

Creme / Pomada

Este medicamento é contraindicado para uso por pessoas sensíveis ao Furoato de Mometasona, a outros corticosteroides ou a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos.

Cápsula

Furoato de Mometasona é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao Furoato de Mometasona ou à lactose.

A terapia com Furoato de Mometasona é contraindicada no tratamento primário do estado de mal asmático ou outros episódios agudos de asma nos quais há necessidade de medidas intensivas.

Dependendo das características clínicas de cada caso, o produto está contraindicado em casos de tuberculose pulmonar ativa ou latente, infecções fúngicas, bacterianas, virais ou parasitárias não tratadas e em casos de herpes simples, inclusive o ocular.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.

Efeitos Colaterais

As reações adversas locais, muito raramente relatadas com o uso de Furoato de Mometasona Creme, incluem parestesia, prurido e sinais de atrofia cutânea. Em menos de 1% dos pacientes que fizeram uso de Furoato de Mometasona Creme 0,1%, foram relatados abscessos, queimação, exacerbação de infecções, pele seca, eritema e furunculose.

As reações adversas locais, raramente relatadas com o uso de Furoato de Mometasona Pomada, incluem ardor, prurido, formigamento/dor local aguda momentânea e sinais de atrofia cutânea. Em menos de 1% dos pacientes que fizeram uso de Furoato de Mometasona Pomada 0,1%, foram relatados sinais alérgicos, dermatite, eritema, furúnculos, aumento da zona de lesão, náusea (apenas um paciente) e corrimento vaginal (apenas um paciente).

Reações adversas adicionais reportadas com o uso de Furoato de Mometasona incluem erupções acneiformes, reações no local de aplicação e foliculite.

As seguintes reações adversas locais foram relatadas pouco frequentemente com o uso de outros corticosteroides tópicos:

Queimação, irritação, ressecamento, hipertricose, hipopigmentação, dermatite perioral, dermatite de contato alérgica, maceração da pele, infecção secundária, estrias e miliária.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

Cápsula

Os dados de segurança descritos a seguir refletem a exposição ao Furoato de Mometasona em pacientes de 12 anos ou mais, avaliados e tratados em 10 estudos clínicos controlados por placebo, de duração de 8 a 12 semanas com um total de 1.750 pacientes e em três estudos que incluíram 475 pacientes recebendo Furoato de Mometasona por um ano.

Os efeitos adversos de Furoato de Mometasona são apresentados em ordem decrescente de incidência:

Reações muito comuns (> 1/10):

Cefaleia, rinite alérgica com asma, faringite aguda, infecção aguda das vias aéreas superiores, dor articular e depressão.

Reação comum (> 1/100 e < 1/10):

Sinusite, candidíase oral, dismenorreia, dor musculoesquelética, dor lombar, dispepsia, mialgia, dor abdominal e pélvica, náuseas e vômitos, fadiga, síndrome semelhante à gripe (calafrios com febre, mialgia), gastroenterite (gastroenterite e colite não infecciosas), anorexia, otalgia, infecção, disfonia, epistaxe.

Reações incomuns (> 1/1.000 e < 1/100):

Catarata

DCB-Denominação Comum Brasileira

06061.