

**Posologia**

Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, com algum líquido, pela manhã, com ou sem alimento.

Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

A dose inicial usual é de um comprimido deste medicamento 2,5/6,25 mg uma vez ao dia. Se o efeito anti-hipertensivo for insuficiente, pode-se aumentar a dose para um comprimido deste medicamento 5/6,25 mg uma vez ao dia. Caso a resposta ainda seja insuficiente, a dose pode ser aumentada para um comprimido deste medicamento 10/6,25 mg uma vez ao dia.

**Duração do tratamento**

O tratamento com este medicamento gradativa do tratamento com bisoprolol, pois a interrupção abrupta do bisoprolol pode ocasionar deterioração aguda da condição do paciente, em particular naqueles com doença cardíaca isquêmica.

**Doses perdidas**

Caso uma tomada seja esquecida, esta deve ser realizada tão logo possível no mesmo dia.

Caso contrário, tomar a próxima dose no dia seguinte, no horário habitual.

**Uso em presença de insuficiência renal ou hepática**

Não é necessário ajuste de dose em pacientes com insuficiência hepática leve a moderada ou insuficiência renal leve a moderada (clearance de creatinina > 30ml/min).

**Uso em idosos**

Normalmente não é necessário ajuste de dose em idosos.

**Uso pediátrico**

A experiência com este medicamento em uso pediátrico é limitada; desta forma, o emprego em crianças não pode ser recomendado.

**Indicações do produto**

Hipertensão arterial.

**Contra Indicações**

Este medicamento é contraindicado em pacientes com

- Hipersensibilidade ao bisoprolol, à hidroclorotiazida, outras tiazidas, sulfonamidas ou a qualquer dos excipientes;
  - Insuficiência cardíaca aguda ou durante episódios de descompensação da insuficiência cardíaca que requeiram terapêutica inotrópica intravenosa;
  - Choque cardiogênico;
  - Bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau (sem marca-passo);
  - Síndrome do nó sinusal;
  - Bloqueio sinoatrial;
  - Bradicardia sintomática;
  - Asma brônquica grave;
  - Formas graves da Síndrome de Raynaud ou formas graves de doença arterial oclusiva periférica;
  - Feocromocitoma não tratado;
  - Insuficiência renal grave (clearance da creatinina < 30 mL/min);
  - Insuficiência hepática grave;
  - Acidose metabólica;
  - Hipopotassemia refratária .
- Este medicamento é contraindicado em crianças de qualquer faixa etária.

**Efeitos Colaterais**

As frequências são definidas em

Muito comuns ( $> 1/10$ );

Comuns ( $> 1/100$  e  $< 1/10$ );

Incomuns ( $> 1/1.000$  e  $< 1/100$ );

Raras ( $> 1/10.000$  e  $< 1/1.000$ );

Muito raras ( $< 1/10.000$ );

Frequência não conhecida (não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis).

Distúrbios do sangue e sistema linfático

Raros

Leucopenia, trombocitopenia.

Muito raros

Agranulocitose.

Distúrbios do metabolismo e nutrição

Incomuns

Perda de apetite, hiperglicemia, hiperuricemia, distúrbios hidroeletrólíticos (particularmente hipopotassemia e hiponatremia, como também hipomagnesemia, hipocloremia e hipercalcemia).

Muito raros

Alcalose metabólica.

Distúrbios psiquiátricas

Incomuns

Depressão, distúrbios do sono.

Raros

Pesadelos, alucinações.

Distúrbios do sistema nervoso

Comuns

Tontura\*, cefaleia\*.

Distúrbios oculares

Raros

**DCB-Denominação Comum Brasileira**

não tem