

Posologia

Aplicar Hialuronidase + Betametasona 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, durante 3 semanas ou conforme orientação médica.

Aplicar na extremidade do pênis, após tração leve da pele (sem causar dor). E a seguir até a metade da haste peniana.

Aumentar a tração da pele a partir do sétimo dia de uso de Hialuronidase + Betametasona.

Após o término da massagem, reposicionar a pele (prepúcio) sobre a glândula.

Retornar ao médico na data recomendada.

Hialuronidase + Betametasona deve ser aplicado, por via tópica, na região do prepúcio 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, durante 3 semanas, ou conforme orientação médica. Após esse período, o paciente deve ser novamente avaliado pelo médico. Caso necessário, o tratamento pode ser repetido por mais um período, de acordo com a orientação médica.

Hialuronidase + Betametasona pode ser aplicado em pacientes com idade entre 1 e 30 anos.

Indicações do produto

Hialuronidase + Betametasona é indicado no tratamento clínico tópico da fimose.

Contra Indicações

Hialuronidase + Betametasona é contraindicado para paciente com hipersensibilidade aos componentes da fórmula do produto.

Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 1 ano de idade.

Efeitos Colaterais

A formulação de Hialuronidase + Betametasona é bem tolerada. O paciente pode apresentar aumento da circulação sanguínea local (hiperemia) e irritação acompanhada de sensação de queimação, ardor ou edema. O desconforto causado por essas reações poderá inibir o paciente de urinar, podendo levá-lo a reter urina. Essas reações desaparecem com a suspensão do tratamento.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – Notivisa, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem