

## Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona

### Posologia

**Gel**  
O frasco deve ser agitado antes do uso e deve ser aplicado na área afetada. Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona não deve ser aplicado diretamente no rosto ou nos olhos. As mãos devem ser lavadas após o uso do produto. Para alcançar melhor resultado não se recomenda tomar banho ou lavar o cabelo (no caso de uso no couro cabeludo) imediatamente após a aplicação, deixando o produto permanecer na pele durante a noite ou durante o dia.

#### Pomada

Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona pomada deve ser aplicado na área afetada. Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona não deve ser aplicado diretamente no rosto ou nos olhos. As mãos devem ser lavadas após o uso do produto. Para alcançar melhor resultado não se recomenda tomar banho imediatamente após a aplicação.

#### Posologia do Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona

##### Gel

Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona deve ser aplicado na área afetada uma vez ao dia. O período recomendado de tratamento é de 4 semanas para o tratamento do couro cabeludo e de 8 semanas para o tratamento em outras áreas do corpo.

Após este período, se for necessário continuar ou reiniciar o tratamento, deve-se fazê-lo após avaliação médica e sob supervisão médica regular.

Ao usar produtos que contenham calcipotriol, a dose máxima diária não deve exceder 15g e a área tratada não deve exceder 30% da superfície corporal.

##### Uso no couro cabeludo

Todas as áreas afetadas do couro cabeludo podem ser tratadas com Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona. Geralmente uma quantidade entre 1 e 4 g por dia é suficiente para o tratamento do couro cabeludo (4 g é equivalente a uma colher de chá).

#### Pomada

Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona deve ser aplicado na área afetada uma vez ao dia. O período recomendado de tratamento é de 4 semanas. Para alcançar melhor resultado não se recomenda tomar banho imediatamente após a aplicação.

Após este período, se for necessário continuar ou reiniciar o tratamento, deve-se fazê-lo após avaliação médica e sob supervisão médica regular.

### Indicações do produto

#### Gel

Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona gel é indicado para o tratamento tópico da psoríase do couro cabeludo e para o tratamento tópico da psoríase vulgar leve a moderada no corpo.

#### Pomada

Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona pomada é indicado para o tratamento tópico da psoríase vulgar.

### Contra Indicações

hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes do produto.

Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona é contraindicado em pacientes com psoríase eritodérmica, exfoliativa ou pustulosa.

Devido ao calcipotriol, Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona é contraindicado em pacientes com distúrbios do metabolismo do cálcio.

Devido à presença do corticosteroide, Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona é contraindicado nas seguintes condições: lesões cutâneas de origem viral (como herpes ou varicela), infecções cutâneas fúngicas ou bacterianas, infecções parasitárias, manifestações cutâneas relacionadas à tuberculose, dermatite perioral, pele atrófica, estrias atróficas, fragilidade das

### Efeitos Colaterais

incluindo estudos de segurança pós-comercialização e relatos espontâneos.

A reação adversa mais frequentemente reportada durante o tratamento é o prurido.

Ordem de gravidade

As reações adversas mencionadas a seguir, estão listadas no MedDRA SOC e estão dispostas individualmente, em ordem decrescente de frequência. Em cada grupo de frequência, as reações estão listadas em ordem decrescente de gravidade.

Muito comum ( $\geq 1/10$ );

Comum ( $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ );

Incomum ( $\geq 1/1.000$  a  $< 1/100$ );

Rara ( $\geq 1/10.000$  a  $< 1/1.000$ );

Muito rara ( $< 1/10.000$ ).

Gel

Infecções

Incomum ( $\geq 1/1.000$  a  $< 1/100$ )

Infecção da pele\*; foliculite

Alterações do sistema imunológico

Rara ( $\geq 1/10.000$  a  $< 1/1.000$ )

Hipersensibilidade

Alterações oftalmológicas

Incomum ( $\geq 1/1.000$  a  $< 1/100$ )

Irritação nos olhos

Alterações da pele e tecidos subcutâneos

Comum ( $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ )

**DCB-Denominação Comum Brasileira**

Não tem