

Posologia

Hidróxido de Alumínio + Hidróxido de Magnésio + Carbonato de Cálcio comprimido mastigável

Adultos

1 a 2 comprimidos mastigáveis, diariamente, meia a uma hora antes das principais refeições e ao deitar.

Outros esquemas apropriados podem ser instituídos a critério médico.

Hidróxido de Alumínio + Hidróxido de Magnésio + Carbonato de Cálcio pó efervescente

Ingerir o conteúdo de 1 a 2 envelopes diluídos em 100 mL a 200 mL de água, conforme a necessidade. Não ultrapassar a dose máxima de 10 envelopes por dia. Não repetir a administração em intervalos menores que 1 hora.

Outros esquemas apropriados podem ser instituídos a critério médico.

Após diluído, usar imediatamente.

Hidróxido de Alumínio + Hidróxido de Magnésio + Carbonato de Cálcio suspensão oral

Adultos

Ingerir de 1 a 2 colheres das de sopa (1 colher de sopa é igual a 15 mL), diariamente, meia a uma hora antes das refeições e ao deitar.

Crianças

A critério médico.

Outros esquemas apropriados a cada caso podem ser instituídos a critério médico.

Agite antes de usar.

Indicações do produto

Hidróxido de Alumínio + Hidróxido de Magnésio + Carbonato de Cálcio é indicado em casos de acidez estomacal, azia, desconforto estomacal, dor de estômago, dispepsia, enjoo, náusea, vômito, epigastralgia, má digestão e queimação.

Contra Indicações

Este medicamento é contraindicado a indivíduos que apresentem hipersensibilidade a algum componente de sua fórmula. Hidróxido de Alumínio + Hidróxido de Magnésio + Carbonato de Cálcio é contraindicado a pacientes com hipofosfatemia, devido à ocorrência de depleção de potássio pelos sais de alumínio. Também é contraindicado a pacientes com insuficiência renal severa devido ao risco aumentado de ocorrência de hipermagnesemia e em casos de hipercalcemia.

A utilização de antiácidos durante a gravidez deve ser realizada sob orientação médica.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos (para comprimido mastigável e pó efervescente).

Efeitos Colaterais

Eventualmente, pequenas alterações no trânsito intestinal (constipação intestinal e diarreia) poderão ocorrer com o uso do medicamento, sendo que estas alterações desaparecerão com a simples interrupção do tratamento.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem