

Hipromelose + Cetrimida

Posologia

uso tópicos ocular, uso Adulto e Pediátrico.

Salvo prescrição contrária, aplicar uma gota deste medicamento no saco conjuntival de 3 a 5 vezes por dia ou com maior frequência caso necessário.

Usar Hipromelose + Cetrimida (substância ativa) exclusivamente nos olhos.

Indicações do produto

Hipromelose + Cetrimida (substância ativa) é indicado no tratamento sintomático das manifestações de ressecamento da córnea e conjuntiva, causadas por secreção lacrimal deficiente e distúrbios funcionais resultantes de processos patológicos locais ou sistêmicos, bem como no caso de ausência ou deficiência do fechamento da pálpebra.

Contra Indicações

componentes da fórmula.

Gravidez: Categoria C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-

Efeitos Colaterais

Não há registro de reações adversas.

Em caso de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

Não tem