

Posologia

Dissolver um envelope em um copo com água (200 mL) e tomar uma vez ao dia. Após o preparo, consumir imediatamente por via oral.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico.

Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista

Indicações do produto

Macrogol é indicado para constipação ocasional.

Contra Indicações

Esse medicamento é contraindicado para pacientes com quadro conhecido ou suspeito de obstrução (náusea, vômito, dor abdominal), perfuração intestinal, apendicite e sangramento retal.

Você não deve utilizar Macrogol se tiver hipersensibilidade (alergia) ao Macrogol ou a qualquer componente da fórmula.

Não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos de idade.

Efeitos Colaterais

Esse medicamento pode causar diarreias, flatulências, náuseas, cólicas abdominais ou inchaços.

Não deve ser utilizado por mais de 2 semanas, a não ser que o paciente seja acompanhado por um profissional de saúde.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

DCB-Denominação Comum Brasileira

NAO TEM