

Maleato de Dexclorfeniramina

Posologia

resposta individual do paciente.

Maleato de Dexclorfeniramina comprimidos revestidos

Adultos e crianças maiores de 12 anos

1 comprimido 3 a 4 vezes por dia.

Não ultrapassar a dose máxima de 12mg/dia (ou seja, 6 comprimidos/dia).

Maleato de Dexclorfeniramina comprimidos revestidos não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Maleato de Dexclorfeniramina drágea repetabs

Adultos e crianças maiores de 12 anos

1 drágea pela manhã e outra ao deitar.

Em determinados casos mais resistentes, seria recomendável a administração de 1 drágea a cada 8 horas.

Maleato de Dexclorfeniramina drágea repetabs não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Maleato de Dexclorfeniramina solução

Adultos e crianças maiores de 12 anos

5mL 3 a 4 vezes por dia.

Não ultrapassar a dose máxima de 12mg/dia (ou seja, 30mL/dia).

Crianças de 6 a 12 anos

2,5mL três vezes por dia.

Um máximo de 6mg diários (ou seja, 15mL/dia).

Crianças de 2 a 6 anos

1,25mL três vezes por dia.

Um máximo de 3mg diários (ou seja, 7,5mL/dia).

Maleato de Dexclorfeniramina solução gotas

Adultos e crianças maiores de 12 anos

Indicações do produto

Maleato de Dexclorfeniramina é indicado para alergia, prurido, rinite alérgica, urticária, picada de inseto, conjuntivite alérgica, dermatite atópica e eczemas alérgicos.

Contra Indicações

Este medicamento é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou a outros anti-histamínicos de estrutura química similar. Maleato de Dexclorfeniramina, como os demais anti-histamínicos, não deve ser usado em prematuros ou recém-nascidos e em pacientes que estão fazendo uso de inibidores da monoaminoxidase (IMAOs).

Maleato de Dexclorfeniramina comprimido revestido e drágeas repetabs é contraindicado na faixa etária abaixo de 12 anos.

Maleato de Dexclorfeniramina solução, solução gotas e creme são contraindicados na faixa etária abaixo de 2 anos.

Maleato de Dexclorfeniramina creme não é indicado para o uso nos olhos (oftálmico).

Deve-se evitar a exposição à luz do sol das áreas tratadas com Maleato de Dexclorfeniramina Creme, pois podem ocorrer reações indesejáveis na pele. O tratamento deverá ser suspenso se ocorrer sensação de queimação, erupções, irritações ou se não houver melhora do quadro. Evite o uso prolongado ou o uso em áreas extensas da pele, principalmente em crianças. Não se deve aplicar Maleato de Dexclorfeniramina creme em áreas da pele que apresentem bolhas, que não estejam íntegras ou que apresentem secreção, ao redor dos olhos, genitália ou em outras mucosas. Deve-se evitar cobrir a área que está sendo tratada.

Efeitos Colaterais

Poderá ocorrer sonolência leve ou moderada durante o uso deste medicamento.

Os eventos adversos de Maleato de Dexclorfeniramina são apresentados em frequência decrescente a seguir:

Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)

Sonolência leve ou moderada durante o uso.

Reações raras (ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento)

Cardiovasculares: hipotensão arterial; cefaleia; taquicardia;

Gerais devido o uso de antialérgico: urticária; prurido; erupções na pele; sensibilidade na pele quando exposta ao sol; hiperidrose calafrios; fraqueza; choque anafilático;

Gastrointestinais: azia; desconforto gástrico; obstipação; náuseas;

Geniturinários: disúria; poliúria alterações no ciclo menstrual;

Hematológicos: anemia hemolítica; anemia hipoplásica; trombocitopenia e agranulocitose;

Neurológicos: visão borrada e nervosismo;

Respiratórios: espessamento das secreções brônquicas; compressão do tórax; desconforto nasal; dificuldade respiratória.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - Vigimed, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

DCB-Denominação Comum Brasileira

02839.